

<<临床骨科护理细节>>

图书基本信息

书名：<<临床骨科护理细节>>

13位ISBN编号：9787117094030

10位ISBN编号：7117094036

出版时间：2008-1

出版单位：人民卫生

作者：李连红

页数：424

字数：358000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<临床骨科护理细节>>

内容概要

护理工作注重细节，成也细节，败也细节，若干个细节的1%组成了护理工作100%的成功。因此，我们应该把握护理工作的细节，认真求实、埋头苦干，从而使护理工作走上成功之路。

本书着手于骨科护理发展的需要而编写，内容涵盖了骨科患者的一般护理、骨科常用护理、骨科急救护理、骨科创伤护理、常见骨病的护理及骨科特殊检查与治疗方法等内容。

本书既强调了疾病的护理，又体现了程序化的护理模式。

全书按照护理程序做了细致的归纳和总结，使读者既能掌握骨科护理的技术要领，又能学到整体护理相关的知识，内容全面、条理清楚，便于记忆。

本书可供临床护理工作者、护理专业人员及护理教师参考使用，是一本实用的骨科护理参考书。

<<临床骨科护理细节>>

书籍目录

1 绪论 细节1：骨科护理的发展 细节2：骨科护理的基本内容 细节3：骨科患者护理的特点
 细节4：骨科护理人员的专业素质 2 骨科患者的一般护理 2.1 骨科患者入院后的护理 细节1：
 搬动患者的力学要求与方法 细节2：骨科体位的安置要求 细节3：骨科患者入院后的护理评估
 细节4：骨科患者肢体畸形的预防与护理措施 2.2 骨科患者手术前护理 细节1：骨科手术的性
 质与分类 细节2：骨科患者手术前的护理评估 细节3：骨科患者手术前的护理措施 细节4：
 骨科患者手术前的健康教育 2.3 骨科患者手术中护理 细节1：骨科手术的常用体位与无菌单的铺
 置 细节2：骨科常用麻醉方法与护理评估 细节3：骨科手术的护理评估 细节4：骨科手术的
 护理措施 细节5：麻醉苏醒期的护理措施 2.4 骨科患者手术后护理 细节1：骨科患者手术后的
 各项准备 细节2：骨科患者手术后的护理评估 细节3：骨科患者手术后的护理措施 细节4：
 骨科患者手术后功能锻炼的原则、内容与方法 细节5：骨科患者手术后常见并发症的预防与护理
 措施 2.5 骨科患者出院前的护理 细节1：出院患者的心理与物质准备 细节2：出院患者的健康
 教育 3 骨科常用护理技术 3.1 石膏固定术的护理 细节1：石膏固定的目的、适应证与禁忌证
 细节2：石膏固定的常用类型与作用 细节3：石膏的包扎、开窗与拆除 细节4：石膏固定患者的
 护理评估 细节5：石膏固定患者的护理措施 细节6：石膏固定患者的健康教育 3.2 牵引技术的
 护理 细节1：牵引术的目的与适应证 细节2：牵引术的种类与方法 细节3：牵引患者的护理
 评估 细节4：牵引患者的护理措施 细节5：牵引患者的健康教育 3.3 支具的应用与护理 细
 节1：支具应用的目的与适应证 4 骨科急救护理 5 骨科创作的护理 6 常见骨病的护理 7 骨科特殊检
 查及治疗方法参考文献

<<临床骨科护理细节>>

章节摘录

骨科常用护理技术 3.2 牵引技术的护理 细节1：牵引术的适应证 牵引术的目的
牵引技术是通过牵引装置，利用牵引力与反牵引力对肢体或躯干进行牵拉，使骨折、脱位获得复位和固定，使关节挛缩畸形得到矫正的方法。

牵引既有复位又有固定作用，是骨科常用的治疗技术 (1)使骨折、关节脱位复位 (2)稳定骨折断端，有镇痛和便于骨折愈合的作用 (3)固定患肢，防止病理性骨折 (4)使关节置于功能位，矫正和预防关节屈曲挛缩畸形 (5)使肢体制动，减少局部刺激，减轻局部炎症扩散

(6)解除肌肉痉挛，改善静脉血液回流，消除肢体肿胀 (7)治疗轻、中度的椎间盘突出，减轻脊髓和神经压迫症状 (8)便于患肢伤口的观察、冲洗和换药，便于患者的护理 牵引术的

适应证 (1)新鲜骨折及畸形愈合的骨折 (2)关节脱位 (3)关节炎等病变 (4)骨肿瘤、骨髓炎等骨骼病变 (5)颈椎病及腰椎间盘突出症 细节2：牵引术的种类方法 (一)兜带牵引 兜带牵引是指利用帆布、皮革等材料按局部体形制成各种布兜及牵引带，包绕或固定患部，通过牵引装置施加牵引力，进行各种牵引复位的治疗方法。

可持续或间歇牵引。

枕颌带牵引 患者取坐位或卧位，用枕颌布带前带托住下颌，后带兜住枕骨粗隆。再用横行布带连接前后两条纵向布带，以防止滑脱。

用一竹棍穿入枕颌带远端孔内，使两侧牵引带保持比头稍宽的距离，通过滑轮及牵引架加重量进行牵引。

常用于颈椎骨折、脱位和颈椎结核、颈椎病等，牵引重量一般不超过5kg 骨盆兜带牵引 患者取仰卧位，用帆布制成束带式包兜包托于骨盆。

系骨盆带时需保证其宽度的2/3缚在髂嵴以上的腰部，牵引带在骨盆两侧对称，在足侧系于滑轮上牵引，一般每侧牵引常用重量为10kg左右，最多不超过20kg，同时床脚抬高15cm，利用人体重量作为对抗牵引。

常用于腰椎间盘突出症有腰神经根刺激症状者骨盆兜悬吊牵引 患者取仰卧位，用厚帆布制成骨盆兜，上抵髂骨翼，下达股骨大转子，放于腰及臀后部托起骨盆。

将兜带从后方包住骨盆，前方两侧各系一牵引绳，交叉至对侧上方滑轮上悬吊牵引，常用于骨盆骨折的复位与固定。

牵引重量以臀部可抬离床面5cm为宜，这样患者感觉舒适，擦背及放置便盆等操作也较方便。

4-6周后解除索引。

<<临床骨科护理细节>>

编辑推荐

《临床骨科护理细节》可供临床护理人员、护理专业人员及护理教师参考使用，是一本实用的骨科护理参考书。

<<临床骨科护理细节>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>