第一图书网, tushu007.com

<<草花生产与应用>>

图书基本信息

书名：<<草花生产与应用>>

13位ISBN编号：9787503866470

10位ISBN编号：7503866470

出版时间：2012-7

出版时间：王建梅 中国林业出版社 (2012-07出版)

作者：王建梅

页数：190

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

随着经济的发展和文化水平的提高，人们对居住环境的要求也越来越高。居住环境不仅用树木、草坪装饰，还要用花卉来装点，使人们在绿色中看到各种美丽的鲜花，草花的应用越来越多，形式也多种多样。

<<草花生产与应用>>

书籍目录

前言 第一章草花的分类／001 （一）一年生花卉／001 （二）二年生花卉／001 （三）多年生花卉／001 1.宿根花卉／002 2.球根花卉／002 第二章草花育苗栽培与病虫害防治／003 一、一年生花卉／003 1.万寿菊／003 2.藿香蓟／005 3.香雪球／007 4.鸡冠花／008 5.凤仙花／012 6.紫茉莉／015 1.五姨t 016 8.雁来红／019 9.一串红／020 10.千日红／024 11.波斯菊／026 12.百日草／027 13.矮牵牛／031 14.半支莲／034 15.麦秆菊／035 16.银边翠／038 17.醉蝶花／040 18.地肤／041 19.霞草／042 20.旱金莲／020 21.莺萝／046 22.五色苋／048 23.牵牛花／049 24.翠菊／052 25.矮雪轮／053 26.贝壳花／054 27.蓝花鼠尾草／055 28.花烟草／056 29.向日葵／057 30.硫华菊／059 二、二年生花卉／069 1.黄晶菊／069 2.三色堇／072 3.紫罗兰／075 4.雏菊／078 5.羽衣甘蓝／079 6.金鱼草／081 1.月见草／085 8.桂竹香／086 9.虞美人／088 10.花菱草／090 31.绸缎花／060 32.银叶菊／060 33.矢车菊／062 34.花环菊／063 35.飞燕草／065 36.彩叶草／066 37.长春花／068 11.毛地黄／O91 12.美女樱／092 13.金盏菊／095 14.福禄考／098 15.猴面花／100 16.送春花／101 17.香豌豆／102 18.蜂室花／104 19.龙面花／104 三、多年生花卉／106 （一）宿根花卉／106 1.芍药／106 2.荷包牡丹／109 3.菊花／111 4.鸢尾／115 5.荷兰菊／118 6.玉簪／119 7.萱草／121 8.大花金鸡菊／123 9.宿根福禄考／124 10.八宝景天／126 11.新几内亚凤仙／127 12.黑心菊／129 13.石碱花／130 14.蜀葵／131 15.金光菊／134 16.四季海棠／135 17.宿根天人菊／136 18.假龙头／137 （二）球根花卉／138 1.大丽花／138 2.唐菖蒲／141 3.大花美人蕉／144 4.郁金香／147 s.百合／151 6.晚香玉／154 7.水仙／156 第三章草花花期调控技术／160 一、制定可行的生产计划／160 （一）了解草花需求时节／160 （二）选择合适的品种／160 （三）了解草花生长周期／161 二、通过技术手段调节花期／161 （一）光反应处理／162 （二）温度调控／162 （三）水分调节／162 第四章草花的应用／163 一、花坛／163 （一）花坛的类型／163 1.花丛式花坛（盛花花坛）／164 2.模纹花坛／166 3.立体花坛／167 （二）花坛的设置／169 1.花坛的位置和形式／169 2.花坛的高低和大小／169 3.花坛的色彩／170 （三）花坛的栽植与管理／170 （四）花坛的更换／171 二、花境／172 （一）花境的特点／172 （二）花境的分类／173 （三）花境的布置／174 三、花丛与花群／175 四、花钵与花台／176 （一）花钵／176 （二）花台／177 五、垂直绿化／178 附：《中华人民共和国种子法》（节选）／179 参考文献／189

章节摘录

版权页： 插图： 幼苗定植或上盆后，注意浇水、施肥、松土和除草。
幼苗前期生长缓慢，以后逐渐加快。
生长旺季每周追施2次液肥，花前增施P、K肥；孕蕾期增施0.2%KH2PO4和1%尿素混合液，每10天喷洒叶面1次。
在修剪、摘心期间，每周追施一次腐熟的“ 矾肥水 ”。
夏季若持续高温（35℃以上），必须进行遮阴或直接叶面喷水降温，以便安全越夏。
国庆和元旦用花转入温室或保暖温棚越冬时，温度不低于5℃为宜。
欲使一串红株丛茂密，开花不断，可在6月花后，对其进行强修剪，保留植株下部健壮腋芽，加强肥水管理，10月可再度开花，达到控制花期的目的。
【病虫害防治】 （1）花叶病：是一串红的常见病害，分布广，发生普遍，栽培一串红的地区均有发生。
植株染病后，叶片主要表现为浅绿与深绿色相间的花叶线形，或鲜黄色与淡绿色的斑驳。
叶片变小且皱缩不平，质地变脆，甚至呈蕨叶状。
花少，病株一般比健康株矮小。
引起一串红病毒的病原有多种病毒，由多种蚜虫传播。
秋播一串红在“ 五 · 一 ”用花期间很少发病，而春播的一串红在秋季发病严重，这与蚜虫的发生和危害有密切关系。
防治方法为：及时清除苗圃周围的杂草，发现病株应及时拔除烧毁或深埋。
要控制该病的发生和蔓延，施用杀虫剂（1.2%烟参碱乳油1000～2000倍液或1.8%齐螨素乳油6000～8000倍液）防治蚜虫是极为重要的措施；选择无毒健康的植株作为采种或采穗的母株；用200倍等量式波尔多液或500倍多菌灵药液喷洒防治。
（2）疫霉病：主要危害一串红的茎、枝和叶片，发病时多发生在离地面1～2厘米分权处或茎节处，初现水渍状暗红色不规则病斑，扩大成黑褐色，最后形成黑色斑块，导致叶片枯死。
叶片受害初现近圆形水渍状暗绿色大斑块，边缘不明显，多发生在叶缘和叶基部，叶柄发病时叶片下垂，潮湿时会产生白色霉状物。
防治方法：及时清除病株及病残体；病土可用70%五氯硝基苯按照每平方米5～10克进行消毒处理；发病初期可用75%的百菌清700倍液防治。
（3）青枯病：该病在一串红的苗期不表现症状，仅在花前和开花期表现症状。
首先是顶部叶片萎缩，随后下部叶片枯萎，叶片保持绿色，只是颜色稍淡。
初期白天叶片萎蔫，夜晚恢复正常，很容易让人误以为是“ 缺水萎蔫 ”而导致死亡。
但病株根部常会腐烂，茎部表皮粗糙，并产生白色不定根，如果切断用手挤会渗出污白色黏液，这是该病的主要特征。
该病在盛夏高温多雨季节发病严重，地势低洼、排水不畅、连作、缺钾肥、管理不善等都易导致发病，酸性土比碱性土发病严重。
病菌在土壤中越冬，存活时间可长达14个月至6年，随着雨水、流水、农具、昆虫等传播，并多从根部或茎部的伤口或皮孔处侵入。
防治方法：实行轮作；调节土壤pH值，使之成为微碱性，并结合施加腐熟的有机肥进行预防；发现病株，应及时拔除并销毁；发病初期或大雨后喷施200～500毫克／千克农用链霉素或1：1：240的波尔多液，每7～10天喷1次，连续喷3～4次即可见效；也可用5%福美双可湿性粉剂500倍液或灌石灰水防治。

编辑推荐

《农民致富经:草花生产与应用》中草花品种较多，色彩很多，在很大程度上能满足植物造景中色彩变化的要求。
草花株型低矮，对土壤的生长条件要求较小，是植物快速造景中的最佳材料。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com