

<<家庭安全用药千问>>

图书基本信息

书名：<<家庭安全用药千问>>

13位ISBN编号：9787506742054

10位ISBN编号：7506742055

出版时间：2009-8

出版时间：国家食品药品监督管理局新闻办公室、中国药学会 中国医药科技出版社 (2009-08出版)

作者：国家食品药品监督管理局新闻办公室，中国药学会 编

页数：121

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<家庭安全用药千问>>

内容概要

《家庭安全用药千问》是由国家食品药品监督管理局新闻办公室、中国药学会组织编写的普及安全用药知识用书。

与一般家庭安全用药知识读物不同的是，《家庭安全用药千问》把安全用药知识提炼编辑成1500道竞赛题，以新颖的视角、轻松有趣的形式，宣传国家药品安全监管政策，普及安全用药知识.倡导家庭健康生活常识，为广大读者了解安全用药知识开辟了一条捷径，为各级组织开展“安全用药，家庭健康”知识竞赛提供了一本内容丰富、实用便捷的工具书。

<<家庭安全用药千问>>

书籍目录

必答题生活常识(1 ~ 82题)医学知识(83 ~ 169题)药学知识(170 ~ 384题)药学技术(385 ~ 420题)快答题生活常识(421 ~ 589题)医学知识(590 ~ 805题)药学知识(806 ~ 1240题)药学技术(1241 ~ 1260题)、抢答题生活常识(1261 ~ 1295题)医学知识(1296 ~ 1313题)药学知识(1314 ~ 1406题)药学技术(1407 ~ 1425题)风险题生活常识(1426 ~ 1443题)医学知识(1444 ~ 1454题)药学知识(1455 ~ 1491题)药学技术(1492 ~ 1500题)

<<家庭安全用药千问>>

章节摘录

674.急性荨麻疹的主要原因胃肠功能紊乱。

参考答案：错（药物和食物）675.医学上把人眼内晶状体的混浊叫白内障 参考答案：对676.丙型肝炎可经血液传播、母婴传播、性传播 参考答案：对677.细菌对抗菌药物不敏感，病毒则非常敏感。

参考答案：错678.癌症常用的治疗方法有化疗、放疗、手术。

参考答案：对679.腹泻时不宜食用含有长纤维的蔬菜和水果。

参考答案：对680.所有感染性腹泻都应该使用抗菌药物治疗。

参考答案：错681.肺癌患者术前作纤维支气管镜是有必要的。

参考答案：对（此项检查是手术患者不能省略的）682.有人说只要查出了是肺癌就一定是晚期了。

参考答案：错（只要定期查体，早期肺癌是可以检查出来的）683.哮喘症状缓解后应立即停药，避免副作用。

参考答案：错684.只要确诊为糖尿病就应该立即使用胰岛素。

参考答案：错685.尿毒症贫血严重的患者都应大量补充铁剂。

参考答案：错686.更年期的糖尿病妇女可以自行补充雌激素。

参考答案：错687.风湿性关节炎与类风湿性关节炎是同一种病。

参考答案：错688.肝癌患者的肝功能检查的结果一定是异常的。

参考答案：错（肝脏有强大的代偿功能，肝癌时一部分肝细胞发生癌变，其余肝细胞能替代这部分肝细胞的功能，所有当患有肝癌时，肝功能检查结果仍可能正常）689.刺激性咳嗽、痰中带血是早期肺癌的症状之一。

参考答案：对690.慢性肾炎都应使用肾上腺皮质激素进行治疗。

参考答案：错691.更年期是女性特有的生理时期，男性则没有。

参考答案：错692.骨质疏松的表现有骨痛、肌无力、驼背和骨折。

参考答案：对693.如无胸闷、胸痛、气短等症状，就不是冠心病。

参考答案：错694.慢性失血是导致缺铁性贫血最重要的原因之一。

参考答案：对695.乳腺癌患者出现股骨转移后仍可进行重体力活动。

参考答案：错（乳腺癌股骨转移时患者骨折风险增加，应避免重体力活动）696.小儿慢性胃炎的常见症状为腹痛或上腹部不适。

参考答案：对697.治疗消化性溃疡，胃痛消失后就可以停止用药。

参考答案：错698.给孩子喂奶期间绝对不能使用治疗哮喘的药物。

参考答案：错699.尿毒症患者进行透析治疗时，不需要药物治疗。

参考答案：错700.淋巴瘤分为霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤两种。

参考答案：对

<<家庭安全用药千问>>

编辑推荐

《家庭安全用药千问》为中国医药科技出版社出版。

<<家庭安全用药千问>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>