

<<伤寒论讲义>>

图书基本信息

书名：<<伤寒论讲义>>

13位ISBN编号：9787506753999

10位ISBN编号：7506753995

出版时间：2012-6

出版时间：中国医药科技出版社

作者：李克绍

页数：187

字数：177000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<伤寒论讲义>>

内容概要

李克绍编著的《伤寒论讲义》由伤寒大家李克绍亲自编写而成，对《伤寒论》六经辨证各条文进行了细致深入的讲解。

读者从《伤寒论讲义》中，能够寻觅到李克绍先生研究《伤寒论》的学术思想，领会仲景六经辨证精髓，适合各级中医院校师生阅读参考。

<<伤寒论讲义>>

书籍目录

第一章太阳病

- 第一节太阳病纲要
- 第二节太阳病的传变
- 第三节太阳经证
- 第四节太阳腑证
- 第五节太阳变证
- 第六节温病、风湿、停痰

第二章阳明病

- 第一节阳明病纲要
- 第二节阳明病治法
- 第三节阳明辨证
- 第四节阳明兼证

第三章少阳病

- 第一节少阳病纲要
- 第二节少阳病治法
- 第三节柴胡汤辨证
- 第四节合病并病

第四章太阴病

- 第一节太阴病纲要
- 第二节太阴病治法
- 第三节误下转属太阴

第五章少阴病

- 第一节少阴病纲要
- 第二节少阴兼表
- 第三节少阴寒化证治
- 第四节少阴热化证
- 第五节类少阴病
- 第六节少阴咽痛
- 第七节少阴病治禁
- 第八节少阴病预后

第六章厥阴病

- 第一节厥阴病纲要
- 第二节寒热错杂
- 第三节寒热胜负
- 第四节厥阴寒证及诸寒厥
- 第五节厥阴热证及诸热厥
- 第六节厥阴病辨证
- 第七节厥阴病预后

第七章霍乱

- 第一节霍乱病纲要
- 第二节霍乱后又患伤寒
- 第三节霍乱证治

第八章阴阳易及瘥后劳复

- 第一节阴阳易
- 第二节劳复食复的证治

<<伤寒论讲义>>

第三节 瘥后诸病

<<伤寒论讲义>>

章节摘录

版权页：4. 伤寒阳郁身重的证治（原文）伤寒脉浮缓，身不疼，但重，乍有轻时，无少阴证者，大青龙汤发之。

（解释）太阳伤寒，本当脉浮紧身疼痛，但有时因阳气郁闭不解，以致荣卫滞涩，脉可能由浮紧变为浮缓，身痛可能变为身重。

这是由于表邪郁闭过重所致，当以大青龙汤发之。

本条的脉浮缓，是由浮紧变来，必滞涩有力，与太阳中风之弛缓不同。

身重是由身痛变来，有拘束不舒木钝的感觉，与阳明之沉重，少阴之倦怠，都有所不同。

尤其是因表阳时通时滞，而乍有轻时，与阳明少阴之持续性身重不同，为病在太阳的特征。

5. 小结 麻黄汤是发汗峻剂，因此必须是荣卫足表邪实，无汗身疼痛脉浮紧（最低标准亦须浮而不弱）的太阳表实证，始可用之。

麻黄汤证，是表邪郁闭，卫气但合不开，所以卫强而荣不弱。

若水气不能从汗孔外泄，则形成小青龙汤证；若阳扰于胸中，则形成大青龙汤证；荣阴郁极，迫而上行，则形成衄证；衄后阳热随血外泄，有自解者；若不解，麻黄证仍在者，仍宜麻黄汤。

三、麻桂复方证（一）太阳病。

发热恶寒，间歇发作的转归与治疗（原文）太阳病，得之八九日，如症状，发热恶寒，热多寒少，其人不呕，清便欲自可，一日二三度发，脉微缓者，为欲愈也。

脉微而恶寒者，此阴阳俱虚，不可更发汗更下更吐也。

面色反有热色者，未欲解也；以其不能得小汗出，身必痒，宜桂枝麻黄各半汤。

（23）（词解）清：与圜同。

未欲解：是欲解而未能的意思。

（解释）“太阳病，得之八九日”是本节的前提，说明病程已经很长。

以下从“如症状”到“为欲愈也”为一段，说明欲愈的脉证。

从“脉微而恶寒者”到“更下更吐也”为一段，说明阴阳俱虚的脉证及治禁。

“面色反有热色”以下为一段，是在第一段的证候基础上，说明阳气怫郁不得越，就必须桂麻各半汤小发汗以助之。

“如症状”，是说发热恶寒的太阳热型，因伤寒表邪残留未尽，由持续发作，变为一日二三度发的间歇发作。

这既与少阳的往来寒热不同，也和疟疾的一日一发或间日一发不同。

并且其人不呕，二便正常，证明病邪仍在表位。

热多寒少，是发热显著，恶寒轻微。

再结合脉搏微有缓象，说明了本证为邪势已衰，正气将复，故为欲愈之候。

若再兼见面热身痒，这是阳气怫郁在表，欲解而仍不能解的现象，所以用桂麻各半汤小发汗以助其外解。

若八九日后，不是热多寒少，而是脉微恶寒，为外邪虽衰，但正气也很虚，已有转入少阴的趋势，故禁用汗吐下等治法。

桂枝麻黄各半汤方 桂枝一两十六铢（去皮）芍药生姜（切）甘草（炙）麻黄（去节）各一两 大枣四枚（擘）杏仁二十四枚（汤浸，去皮尖及两仁者）上七味，以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，纳诸药，煮取一升八合，去滓，温服六合。

本云：桂枝汤三合、麻黄汤三合，并为六合，顿服。

将息如上法。

（方解）本方是麻桂二汤，各取原剂量1/3的复方。

因麻黄汤开肤表，桂枝汤调荣卫。

量少力轻，适用于表证已衰，余邪未尽，发热恶寒间歇发作的患者。

（二）服桂枝汤大汗出后的两种证治（原文）服桂枝汤，大汗出，脉洪大者，与桂枝汤，如前法。

若形似疟，一日再发者，汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。

<<伤寒论讲义>>

(25) (解释) 服桂枝汤大汗出，是汗不如法，病必不除，外症必有残留，按法当再服桂枝汤，故本条的脉洪大，必按之无力，来盛去衰，仍是阳浮阴弱的脉象，故仍服桂枝汤如前法，以取微汗。

若服桂枝汤大汗出后，恶寒发热症状，由持续发作，变为一日二次间歇发作的，多是无汗表实证，误服桂枝汤，因汗出太骤，或汗出不彻所致。

故用桂二麻一汤和荣卫兼开肤表以发汗。

但应注意的是，其如症状日再发时，亦必发热恶寒而无汗，如果是时发热自汗出而不愈者，那又是桂枝汤主治的范围了。

<<伤寒论讲义>>

编辑推荐

李克绍编著的《李克绍医学全集:伤寒论讲义(修订版)》是一部理论与实践相结合的经典著作,它的理法方药不仅适用于外感伤寒,也适用于内科杂病,所以俞根初认为,《李克绍医学全集:伤寒论讲义(修订版)》“以六经钤百病”。

《李克绍医学全集:伤寒论讲义(修订版)》是学习中医的必读之书,要衡量一个中医学者根柢的深浅,也要以学习《伤寒论》有没有心得体会和能不能融会贯通为尺度。

<<伤寒论讲义>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>