

<<中药斗谱>>

图书基本信息

书名：<<中药斗谱>>

13位ISBN编号：9787509129425

10位ISBN编号：7509129427

出版时间：2009-9

出版时间：人民军医出版社

作者：董毅锋，董超锋，董丹 编著

页数：152

字数：148000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中药斗谱>>

前言

《斗谱》一书，以国家统编中医药大学教材——新世纪第2版《中药学》为基础，以国家《药典》为依据。

主要参考了中医药大学教材《中药炮制学》、国家药品监督管理局组织编写的《中药学综合知识与技能》、谢宗万主编的《常用中药名与别名手册》、周德生主编的《常用中药不良反应与防范》、韩维恒主编的《中药正别名集》等书，在不改变家父董静斗谱基本内容的前提下，予以谱解，并纳入与调剂工作紧密相关且极易忽视而又应掌握的常用中药的采集使用、炮制方法、别名、处方常用名及处方应付和有毒药物的毒性等内容，使之成为基层调剂工作的必备参考书。

该书共编入常用中药511味，一种中药以不同炮制品种入药的有30味。

共分4章。

第1章为斗谱概论，主要规范了斗谱的中药组合及中药在药柜中的具体位置，确定了药柜的制作标准，且编排斗谱时在斗柜、匣柜的底层保留共计32个闲置斗格，以便超范围用药有斗可装。

第2章为谱解，旨在对斗谱组合中药的采集入药、别名和中药组合进行注解说明。

并对临床区别用药和组合药用起指导作用。

对暗柜中的毒补药品和贵重药品临床应用不多，注解从略。

<<中药斗谱>>

内容概要

药斗中所放中药位置的书写组合称为斗谱。

本书作者在继承先父单纯斗谱的基础上予以创新性地谱解，历数谱内常用500余种中药的区别应用，并纳入与调剂工作紧密相关、容易忽视而又应掌握的常用中药的采集使用、炮制方法、别名、处方常用名及处方应付和有毒药物的毒性等内容，是基层中医师、基层中药调剂工作者的必备参考书。

<<中药斗谱>>

作者简介

董毅锋，内蒙古老中医董静先生学术传人。

在其父董静先生的指导下，潜研百年四代家传医学，尽得董静先生临证真传。

在董静先生自创斗谱的基础上予以斗谱理论化，著《中药斗谱》一书，以探索中药斗谱标准化。

并与胞弟董超锋，女儿董丹，合著《中医微创割治学》一书，对董静先生倾毕生之精力钻研整理的民间割治截根疗法进行了系统的理论总结和临床验证。

<<中药斗谱>>

书籍目录

第1章 概论 一、药柜摆放原则 二、中药的装柜原则 三、中药的装斗原则 四、斗谱的药物组合书写原则 五、中药斗谱的基本内容第2章 谱解 一、一组斗柜 辛夷花 苍耳子 刺蒺藜 款冬花 葛根花 枳椇子 野菊花 白菊花 黄菊花 连翘 金银花 金莲花 红花 凌霄花 月季花 鸡冠花 玫瑰花 绿萼梅 缬草 合欢花 合欢皮 枸杞子 五味子 五倍子 紫苏子 白芥子 莱菔子 蕤仁 蔓荆子 决明子 菟丝子 沙苑子 韭菜子 女贞子 楮实子 娑罗子 金樱子 覆盆子 棕榈子 密蒙花 木贼 豆豉 大枣 炒枣仁 生枣仁 黑芝麻 火麻仁 郁李仁 桃仁 瓜蒌仁 冬瓜仁 杏仁 知母 贝母 山药 生薏仁 炒薏仁 胡芦 胡芦巴 胡桃仁 地肤子 蛇床子 急性子 乌梅 诃子 白果 远志 柏子仁 石菖蒲 益智仁 桑螵蛸 海螵蛸 紫豆蔻 白豆蔻 红豆蔻 草果 草蔻 肉蔻 石榴皮 莲子 芡实 使君子 槟榔 鹤虱第3章 常用中药的处方应付第4章 常见有毒药物的毒性附录A 中医药启发式五步教学法

<<中药斗谱>>

章节摘录

暗柜独存贵毒麻：贵重药品、毒麻药品，临床极为少用，故多以暗柜放置。

所谓贵重药，是指稀少昂贵的药物，如冬虫夏草、牛黄、犀角（代）、熊胆（代）、藏红花等；麻醉药是指连续使用，易产生身体依赖，形成瘾癖的一类药物，如罂粟壳；毒性药物，是指药性剧烈有毒，治疗量与中毒量相近，使用不当会导致中毒甚至死亡的一类药物，如砒石（红砒、白砒）、砒霜、水银、雄黄、轻粉、红粉、白降丹、红升丹、生川乌、生草乌、生白附子、生附子、生半夏、生南星、生狼毒、生甘遂、生藤黄、洋金花、闹洋花、雪上一枝蒿、斑蝥、青娘虫、红娘虫、蟾蜍、生马钱子、生巴豆、生千金子、生天仙子。

其中砒石（红砒、白砒）、水银为一类毒性中药，其余为二类毒性中药。

按中药管理法要求，对麻醉药品、毒性药品，要有专人负责，专柜加锁，专账注册，专用处方，专册登记，且做到账物相符。

1. 上轻，中实，下沉。

在中药装斗放置上，通常将质地较轻的花、叶及解表类药或动物躯体和昆虫类药，放在斗柜的最上层；质地坚硬的矿石类药物，放在斗柜的最下层；质地较为坚实的根、皮、茎、果实、种子类药放在斗柜的中层，并将最为常用的中药平胸而放，以便调剂；将相对泡松的中药放在斗柜底层的抽屉之中。本书将第一组、第三组底层抽屉留做机动之用，以避免医生用药偏差而无处装斗之弊。

除此之外，将不常用的药品放在底层或斗柜下方的边角之处。

2. 内大外小难混淆，即使遗漏易捡挑；常用在外迟在内，方便调剂最重要。

在一斗三格的药物装放时，尽量按体积大小，自内而外顺序放置，以免抓药遗漏时，难以挑拣，如萆澄茄、萆苳、萆薢。

但必须在不违背将最常用的中药放置第一斗格，继而中斗格，其次内斗格的原则，如橘红、橘核、橘络。

3. 花子果实贝通利，阴阳气血消肿毒，风湿脾胃肺动矿，分组排放好调剂。

在中药装斗合柜时尽量将花蕾、种子、果实及利小便、通大便及贝壳类的药物放在一斗柜之中；把热性药、寒凉药、滋阴补阳药、调理气血药及清热解毒类药组合一柜，把祛风湿、治四肢、调脾胃、助消化和化痰止咳类药及动物类药、矿石类药组合一柜。

如此分组装斗合柜，便于找药调剂。

找药容易，方便调剂，为指导制作药柜、药物装斗、组合书写斗谱的总则。

<<中药斗谱>>

编辑推荐

药师调配中药 医师临床选药 药柜书写指南

<<中药斗谱>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>