

<<2013骨外科学（中级）>>

图书基本信息

书名：<<2013骨外科学（中级）>>

13位ISBN编号：9787509160015

10位ISBN编号：7509160014

出版时间：2012-10

出版时间：人民军医出版社

作者：曾昭池，阳林俊，陈斌 主编

字数：529000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<2013骨外科学（中级）>>

内容概要

要考过，找“军医”！

5套模拟试卷 + 1套自测卷，共2400题

## &lt;&lt;2013骨外科学（中级）&gt;&gt;

## 章节摘录

## 专业实践能力 1.B。

有7%的月骨，仅有掌侧1~2条较细的血管供给营养，这种月骨容易发生无菌坏死。

还有人注意到尺骨短的人易患此病，可能是因月骨只能与桡骨发生接触，面积相对减少，所受到的应力相对较大，容易受损伤。

## 2：B。

儿童多见，以胫骨上段和股骨下段最多见。

早期只有患区剧痛，肢体半屈曲状，周围肌痉挛，因疼痛抗拒作主动与被动运动局部皮温增高，有局限性压痛，肿胀并不明显。

急性骨髓炎的自然病程可以维持3~4周。

早期阶段有虫蛀状骨破坏与骨质稀疏，并逐渐出现硬化区。

骨膜掀起并有新生骨形，骨膜反应为层状，部分呈三角状。

## 3.A。

慢性骨髓炎的治疗原则是尽可能彻底清除病灶，摘除死骨，清除增生的瘢痕和肉芽组织，消灭死腔，改善局部血液循环，为愈合创造条件。

术前需做细菌培养和药物敏感试验，采用有效抗生素，给予高蛋白饮食和输血等，以增强抵抗力。

## 4.E。

本病是一种继发病变，80%以上的原发病灶在肺和胸膜，其余在消化道和淋巴结。

原发病灶中的结核杆菌一般是通过血流（病原感染）到达骨和关节的；少数是由邻近病灶蔓延而来的，譬如胸膜或纵隔淋巴结结核可侵犯附近的胸椎、肋骨或胸骨。

## 5.D。

多继发于肺或肠结核，结核杆菌由原发病灶经血液侵入关节或骨骼，当机体抵抗力降低时，可繁殖形成病灶，并出现临床症状。

## 6.C。

由于本病是继发性病变，预防的关键在于对原发的肺和肠结核的防治，以降低骨关节结核的发病率，同时增强体质。

## 7.D。

早期彻底清创：清创越早，感染机会越少，疗效越好。

一般应争取在伤后6~8小时进行。

正确处理深部组织损伤，若能在清创的同时修复深部组织，可获较好的疗效。

污染严重，外伤超过12小时以上，或修复技术有困难者，可仅做清创和闭合创口，但有骨折和脱位者必须复位固定。

至于肌腱和神经损伤，可留待二期修复。

## 8.B。

局部因素：局部血液供应；局部损伤程度，损伤严重的骨折，周围软组织损伤也重，骨折多有移位、粉碎或开放，骨膜的撕裂损伤较重，对周围组织和骨折端血运影响较大，加重了骨断端的坏死程度；骨折端的紧密接触和接触面积对骨折的愈合有较明显的影响。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>