

<<2013放射医学（中级）>>

图书基本信息

书名：<<2013放射医学（中级）>>

13位ISBN编号：9787509160022

10位ISBN编号：7509160022

出版时间：2012-10

出版时间：人民军医出版社

作者：龚洪翰

页数：453

字数：713000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<2013放射医学（中级）>>

内容概要

《全国初中级卫生专业技术资格统一考试（含部队）指定辅导用书：2013放射医学（中级）模拟试卷及解析（试卷袋）》紧扣考试大纲，内容的安排既考虑知识点的全面性，又结合考试实际，突出重点、难点，在编写形式上力求便于考生理解和记忆，使考生在有限时间内扎实掌握大纲所要求的知识，顺利通过考试。

《全国初中级卫生专业技术资格统一考试（含部队）指定辅导用书：2013放射医学（中级）模拟试卷及解析（试卷袋）》对知识点的把握非常准，试题与真实考试的符合率非常高，许多考生参加考试之后对《全国初中级卫生专业技术资格统一考试（含部队）指定辅导用书：2013放射医学（中级）模拟试卷及解析（试卷袋）》的质量给予了高度认可。

<<2013放射医学（中级）>>

章节摘录

18.B。

胸腺瘤好发于前纵隔。

19.B。

纵隔神经源性肿瘤好发于后上纵隔脊柱旁，可分为良恶性，其中恶性少见。良性者形态规则，边缘光滑，其内密度均匀。

20.B。

前列腺增生主要发生在移行带，表现为腺体组织和基质组织有不同的增生。

21.D。

前列腺肥大，当增生的移行带压迫临近的尿道和膀胱出口时，可致不同程度膀胱梗阻，每次排尿往往都排不净，留有残余尿，久之，可导致膀胱颈部充血水肿。表现为尿频、尿急、夜尿、排尿困难。

22.B。

若钙化遍及结核肾的全部，甚至输尿管时，即形成所谓的“自截肾”。

23.E。

肾盂乳头状癌好发于40岁男性，肾血管瘤多见于40~60岁女性。肾胚胎瘤疾病别名肾母细胞瘤Wilm瘤，是儿童最常见肾肿瘤。

24.E。

先天性输尿管囊肿为输尿管下端在膀胱内的膨胀，囊肿为膀胱黏膜所覆盖，内层为输尿管黏膜，其间有肌纤维及结缔组织。

25.D。

肾脏通常位于胸12至腰3水平。

26.B。

卵巢癌容易发生腹膜腔种植。

27.B。

前列腺癌主要发生在前列腺的周围带，即周边带，约占70%。

28.C。

肾血管平滑肌脂肪瘤是一种无包膜的错构瘤性的肿块，是肾脏较为常见的良性肿瘤。由不同比例的血管、平滑肌和脂肪组织构成，易出血，是肾脏自发破裂的最常见的原因。

29.C。

儿童期最常见的肾肿瘤是肾母细胞瘤。

30.B。

急性肾梗死，属凝固性坏死，坏死区域呈楔形，是由于组织血供减少引起缺血，终而产生灰白的梗死区。

CT增强扫描有助于肾梗死灶的发现。

31.A。

泌尿系肿瘤最主要的临床特点是无痛性全程血尿。

32.D。

睾丸肿块多用超声及MRI检查，CT很少用于检查睾丸局部肿块。

33.C。

Cushing综合征为肾上腺分泌过多糖皮质激素（皮质醇）。皮质醇主要由肾上腺皮质束状带细胞分泌，肾上腺髓样脂肪瘤及囊肿不会引起皮质醇增多。嗜铬细胞瘤发生于肾上腺髓质，释放大量的儿茶酚胺，而不是皮质醇。排除ABDE，C项均可引起皮质醇增多。

34.A。

肾上腺结核多为双侧性，肾上腺转移瘤可单侧或双侧。

<<2013放射医学（中级）>>

35.A。

喉癌中鳞癌最常见，约占90%。

36.C。

海绵状血管瘤是常见的眶内肿瘤，常表现为眼球突出。

.....

<<2013放射医学（中级）>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>