<<内科难病>>

图书基本信息

书名:<<内科难病>>

13位ISBN编号:9787513202077

10位ISBN编号:7513202079

出版时间:2011-1

出版时间:中国中医药出版社

作者:上海市中医文献馆 编

页数:295

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<内科难病>>

内容概要

本书介绍擅长治疗内科杂病的陈苏生、乔仰先、颜德馨、王翘楚四位中医内科专家。

对各位名医的主要学术思想、临床经验特色,尤其是名医独特的辨证心得,选方、配伍、用药经验, 疑难杂症诊疗体会等进行了深入的阐述。

跟师临床部分以先医案后问答的方式体现"跟"和"做",生动再现了名医的临证思辨过程,使读者有身临其境、随师侍诊之感。

<<内科难病>>

书籍目录

陈苏生
名医简介
学术思相

- 一、首倡理法方药的整体性
- 二、病多参郁,调气为要
- 三、重视温阳,善用附子

经验特色

- 一、哮喘病的诊治经验
- 二、肝病的诊治经验

跟师临床

- 一、冠心病
- 二、风心病
- 三、肺心病
- 四、中风
- 五、情志失调
- 六、白塞病
- 七、慢性肾病
- 八、糖尿病
- 九、胆结石
- 乔仰先

名医简介

学术思想

- 一、杂病治疗,重视治肝
- 二、疾病调理,注重脾肾 三、补泻同用,邪去正安

经验特色

- 一、血液病的诊治经验
- 二、肝病的诊治经验
- 三、老年病的诊治经验
- 四、冠心病的诊治经验

跟师临床

- 一、再生障碍性贫血
- 二、慢性粒细胞性白血病
- 三、红细胞增多症
- 四、血友病
- 五、肝病
- 六、老年病
- 七、冠心病
- 八、心肌炎后遗症
- 九、慢性支气管炎
- 十、中风后遗症
- 十一、郁证十二、水肿十三、泄泻

- 十四、口舌溃疡

<<内科难病>>

十五、	高热
十六、	汗证
颜德룉	E E
名医简	i介
学术思	想

- 一、气血病变是临床辨证的基础
- 二、气血不和,百病乃变化而生
- 三、久病必有瘀,怪病必有瘀
- 四、"衡法"的具体运用

经验特色

- 一、喘证的诊治经验
- 二、胸痹的诊治经验
- 三、失眠的诊治经验
- 四、眩晕的诊治经验
- 五、脾胃病的诊治经验
- 六、血证的诊治经验

跟师临床

- 一、肺源性心脏病
- 二、冠心病心绞痛
- __、 三、高血压病
- 四、偏头痛
- 五、老年性痴呆症
- 六、帕金森病
- 七、失眠
- 八、慢性胃炎
- 九、乙型肝炎
- 十、肝硬化合并腹水
- 十一、慢性结肠炎
- 十二、血管瘤
- 十三、慢性白血病
- 十四、梅尼埃病
- 十五、遗尿
- 十六、弱智

王翘楚

名医简介

学术思想

- 一、精研经典,古为今用
- 二、临证运用,与时俱进
- 三、提出"五脏皆有不寐",立从肝论治法
- 四、横向思维,探索"昼开夜合"之"共同物质基础"

经验特色

- 一、不寐的诊治经验
- 二、焦虑症的诊治经验 三、抑郁症的诊治经验
- 四、小儿夜啼的诊治经验
- 五、高血压病的诊治经验
- 六、荨麻疹的诊治经验

<<内科难病>>

七、	常用	药对	解析

- 跟师临床
- 一、不寐 二、他症合并不寐 三、郁证
- 四、嗜睡
- 五、眩晕
- 六、遗溺
- 七、喘证
- 八、胸痹
- 九、便秘十、瘾疹

- 十一、痤疮 十二、口疮

<<内科难病>>

章节摘录

版权页:插图:3.附子的药用剂量和毒性反应关于附子的有效量和极量问题,国内尚无统一规定,有的本草学上以1.5M为起点,9g为最高量;有的认为可放宽使用到30g以上。

古今以善用附子著名者很多,其用量多少亦不同。

张仲景用生附子1枚,炮附子1枚到3枚,约合今15g至30g、60g不等。

今人多有放胆使用附子者,如四川迁沪之已故能才中医吴佩衡、刘民叔用附子量亦大,一般均在30g以上。

但亦有畏附子如蛇蝎,唯恐出差错者,即使辨证明确,亦不敢贸然应用,或杯水车薪,用量过小,无 济干事。

因而如何正确掌握使用量,是一个重要问题。

一般主张对症下药,适量而止。

姜春华曾指出,凡属阳虚之证,药证相符,不管生附子、炮附子,经过煎煮以后,皆已除去毒性,提出应当改变"乌附毒药、非危症不用"的看法。

近人樊天徒指出,慢性病之用附子,固不必用大量,须连续用之,始克奏效。

其用附子经验,强心用9~12g,急性心衰用生附子9g,风湿顽痛用乌头12g。

附子之应用临床,绝大多数是煎剂。

通过久煮多煎方法,可以使附子中所含的生物碱——乌头碱受到破坏,对减毒方面起到积极的作用。 避免附子中毒的关键在于证药相符,如能掌握药物相辅相成、相反相抑的配伍组织方法,特别是控制 煎煮时间,则自能进退从心,获奏疗效。

故陈老用附子,首先注意附子炮制的规格(各种炮附子以切开打碎为佳);其次注意制附子的解毒药(如干姜、甘草、磁石等);最后注意煎煮的条件,即用开水先浸后煎,要求宽水(加大煎水量)慢火熬透(不可急火加热),煎煮时间在2~3小时以上,看剂量的大小而伸缩,然后再加入其他药同煎

总之,关键在于宽水慢煎,这样有利于破坏附子所含毒性生物碱而起到安全作用。 此外,对从未服过附子的初诊患者,宜从小量(加解毒药)开始,逐步加量,至显效为度。 有人主张附子煎剂宜待其稍凉后服,趁热服之,常易引起烦躁呕吐;有人主张分两次服。 以观动静,则均为审慎措施,可供参考。

<<内科难病>>

编辑推荐

《跟名医做临床:内科难病3》:名医的学术思想和临床经验是一个时代医学成就的典型体现。 中医临床贵在实践,读经典是师法古人,跟名医是师法今人。 上海开埠至今,沪上名医流派之多、人数之广、成就之高一直居于江南乃至全国前列,影响远达海外

本丛书通过沪上名医学术继承人的讲述,真实再现名医的临床思辨过程。

<<内科难病>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com