第一图书网, tushu007.com

<<常用处方药物手册>>

图书基本信息

书名：<<常用处方药物手册>>

13位ISBN编号：9787530439807

10位ISBN编号：7530439804

出版时间：2012-2

出版时间：北京科技

作者：李长龄

页数：810

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

前言

《常用处方药物手册》出版以来得到了广大读者的支持与认可，出版一年就已售罄。在这一年中国家基本药物政策确定，部分药品的信息有所变化，因此在北京科学技术出版社的大力支持下，编者决定将书稿修订再版，以感谢读者的关心与厚爱。

本版书的整体编排体例没有变动，主要对信息发生变动的药品进行了修改，如适应证、用法用量等项目；并对上版书中出现的错误之处，如英文药名、索引、药名前的标注等进行了更正。《2010版常用处方药物手册》仍秉承方便、实用的编写原则，力求为广大临床和药学工作者提供内容全面、可靠，携带方便的参考用书。

本书在编写中虽已尽可能收入新的、准确的资料，但由于药品信息日新月异，难以做到完全无误，在此恳请读者及同仁给予一如既往的支持，提出宝贵的意见与建议。

内容概要

《2010版常用处方药物手册》在编写中虽已尽可能收入新的、准确的资料，但由于药品信息日新月异，难以做到完全无误，在此恳请读者及同仁给予一如既往的支持，提出宝贵的意见与建议。
《常用处方药物手册》出版以来得到了广大读者的支持与认可，出版一年就已售罄。
在这一年中国家基本药物政策确定，部分药品的信息有所变化，因此在北京科学技术出版社的大力支持下，编者决定将书稿修订再版，以感谢读者的关心与厚爱。

作者简介

李长龄，1970年毕业于北京医学院药学系。
曾任北京大学药学院院长，北京大学药学院药理系主任，中国医药教育协会高等药学教育委员会副主任，卫生部继续医学教育委员会药学学科组成员。
现任北京大学药学院教授，博士生导师，中国药学会老年药学专业委员会副主任委员，中国药学会教育与科普工作委员会副主任委员，国家食品药品监督管理局新药审评委员，国家药典委员会委员，中国药理学会心血管专业委员会委员，《中国药理学通讯>副主编，《生理科学进展》《药物不良反应杂志》编委等职。
主编及参编著作多部，主编的主要有《药理学》《药理学应试指南)(国家基本医疗保险临床药物手册》《药理学》(“十五”国家规划教材)《2008药理学和药物分析考点精解》等。

书籍目录

第1章 抗微生物药第2章 抗寄生虫病药第3章 解热镇痛及非缁体抗炎药第4章 镇痛药第5章 麻醉用药第6章 维生素及矿物质缺乏症用药第7章 营养治疗药第8章 激素及调节内分泌功能药第9章 调节免疫功能药第10章 抗肿瘤药第11章 抗变态反应药第12章 神经系统用药第13章 治疗精神障碍用药第14章 呼吸系统用药第15章 消化系统用药第16章 循环系统用药第17章 泌尿系统用药第18章 血液系统用药第19章 调节、水电解质及酸碱平衡药第20章 专科用药第21章 解毒药第22章 诊断用药物第23章 生物制品附录一 国家基本医疗保险药品中成药名录附录二 国家基本医疗保险药品中药饮片名录附录三 中华人民共和国卫生部《处方管理办法》附录四 处方标准(中华人民共和国卫生部)中文索引英文索引

章节摘录

〔制剂规格〕片剂（硫酸盐）：1.1g、0.25g，，　　〔用法用量〕口服。
①成人一次0.25－1.5g（以新霉素计），一日4次。
肝性脑病的辅助治疗，一次0.5－1g，每6小时1次，疗程5－6天。
结肠手术前准备，每小时0.5g，连用4次，继以每4小时0.5g，共24小时。
②儿童一日25－50mg／kg，分4次服用。
〔用药须知〕①可引起食欲缺乏、恶心、腹泻等，但长期应用（10周以上）不影响维生素K的合成。
较少发现听力减退、耳鸣或耳部饱满感、头昏或步履不稳、尿量或排尿次数显著减少或极度口渴。
偶可引起肠黏膜萎缩而导致吸收不良综合征及脂肪性腹泻，甚至伪膜性肠炎。
②对新霉素或其他氨基糖苷类抗生素过敏的患者禁用本品。
③长期口服本品的慢性肠道感染患者尤其伴有肾功能减退或同服其他耳毒性或肾毒性药物者仍应注意出现肾毒性或耳毒性症状的可能。
④妊娠期妇女宜慎用本品。
早产儿及新生儿不宜使用。
依替米星注射剂　　〔中文别名〕博达可、创成、悉能、爱大　　〔药理作用〕本品系半合成水溶性抗生素。
本品的作用机制是抑制敏感菌正常的蛋白质合成。
体外抗菌作用研究表明：本品抗菌谱广，对多种病原菌有较好抗菌作用，其中对大肠埃希杆菌、克雷伯肺炎杆菌、肠杆菌属、沙雷菌属、奇异变形杆菌、沙门菌属、流感嗜血杆菌及葡萄球菌属等有较高的抗菌活性，对部分假单胞杆菌、不动杆菌属等具有一定抗菌活性，对部分庆大霉素、小诺米星和头孢唑林耐药的金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌和克雷伯肺炎杆菌，其体外MIC值仍在本品治疗剂量的血药浓度范围内。
对产生青霉素酶的部分葡萄球菌和部分低水平甲氧西林耐药的葡萄球菌（MRSA）亦有一定抗菌活性。
……

编辑推荐

《常用处方药物手册(2011版)》根据临床用药情况，参考最新公布的《国家基本药物》及《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》进行编写，收载了临床常用药物1876种，其中西药1006种，中药823种，民族药品47种。
内容以介绍西药为主，介绍了药品名称、药理作用、适应证、制剂规格、用法用量和用药须知，编排顺序依照医师开处方的书写次序，便于快速查找，并对国家医保药物分类进行了标注。
本书对中成药823个品种、民族药品47个品种以及中药饮片在附录中列出，并介绍了卫生部最新颁布的处方管理办法及处方标准，供读者查阅。
本书由李长龄担任主编。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com