

<<板栗优质高效栽培>>

图书基本信息

书名：<<板栗优质高效栽培>>

13位ISBN编号：9787533144326

10位ISBN编号：7533144325

出版时间：2009-1

出版时间：山东科学技术出版社

作者：杨力 等 著

页数：99

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<板栗优质高效栽培>>

内容概要

《社会主义新农村建设文库》是一项农村文化建设重点出版工程。

《文库》介绍了科技、文化、法律、生活、市场经济等方面的知识和技术，如农作物种植、家禽饲养、法律基础、卫生保健、村镇住宅规划、进城务工技能、市场经济常识等，都是广大农民群众迫切需要的。

《文库》充分体现了服务“三农”工作，适应农民“求富、求知”需求，努力把图书出版与农民致富奔小康结合起来，融入更多的科技、法律、市场经济等知识，使农民群众在满足文化娱乐需求的同时，从图书中学到更多致富本领，在社会主义新农村建设中更好地发挥主力军作用。

丛书形式生动活泼，图文并茂，通俗易懂，既适合阅读自学，也方便专家重点讲授指导。

<<板栗优质高效栽培>>

书籍目录

一、板栗栽培概述（一）栽培意义及价值（二）国内产区分布及生产概况（三）板栗高产高效潜力（四）板栗生产面临新的考验及对策二、板栗对环境条件的要求及生长结果特点（一）板栗对环境条件的要求（二）生长结果特点（三）结果母枝（四）花果发育（五）影响板栗产量的因素三、板栗优良品种（一）早熟品种（二）中熟品种（三）晚熟品种四、板栗的建园（一）适地适树（二）山地建园（三）平地建园（四）建园注意事项五、育苗（一）育苗途径（二）种用栗的贮备（三）播种（四）苗期管理（五）嫁接方法（六）苗木出圃六、高接换头（一）高接换头的意义（二）高接换头的方法七、整形修剪（一）整形修剪的必要性（二）整形（三）修剪（四）其他技术措施八、土肥水管理（一）板栗的根系特点（二）深翻挖穴、熟化土壤（三）施肥（四）浇水（五）树盘管理九、板栗无公害栽培（一）无公害栽培对灌溉水质的要求（二）无公害栽培对肥料的要求（三）施肥与浇水的统一运筹方案（四）无公害栽培对农药使用的要求十、板栗病虫害防治（一）主要病害（二）主要害虫十一、板栗采收与贮藏技术（一）适时采收（二）贮藏保鲜

<<板栗优质高效栽培>>

章节摘录

二、板栗对环境条件的要求及生长结果特点 (一) 板栗对环境条件的要求 1. 温、湿度
板栗属暖温带果树，喜欢暖湿。

我国从广西百色、大新、玉林等亚热带地区，大约为北纬23°，就有传统的经济栽培，这些地区冬季落叶不尽，树干上终年有青苔。

往北依次为湖南邵阳、怀化产地，湖北、安徽长江中下游产地，大别山、伏牛山、秦岭产地，山东产地，河北、辽宁产地。

长城外河北的兴隆、宽城，辽宁的丹东，直至板栗分布的北缘（吉林的集安、桦甸、延边），大约为北纬43°。

即南北直线跨度为2000千米。

经济产区的北缘如河北兴隆、宽城，冬至低温可降至-26℃，年降水量为400 - 700毫米。

广西全区年均气温在17 - 23℃，1月份6 - 16℃，桂南为全年无霜区，年降水量在1200 - 1800毫米。

其他产地居中。

从南北产地的分布可以看出，栗对湿暖和旱寒的适应范围相当广，性喜暖湿，但对旱、寒又有相当的忍耐力，这是柑橘、苹果、桃等多种果树所不及的。

山东的年平均气温在13℃左右，1月份-5 - 1℃，7月份24 - 27℃，极端最低气温为-27℃。

年降水量在600 - 1100毫米。

尤以泰沂山区、沭河平原为最适。

以泰山前麓阳坡地为例，3月下旬栗芽活动开始，至10月下旬霜降，生长季为270天左右。

在积温较高的年份，通过摘心长出的二茬栗实尚可成熟。

河北长城沿线产地生长季比山东要短2 - 3周，春季积温也相应降低。

苏、浙、皖产区多阴雨天，日照、能量不及北方旱作区，5月下旬至6月初花期多雨，气温降低。

所以山东半岛和沭河产地具有较南北都为优越的条件。

<<板栗优质高效栽培>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>