第一图书网, tushu007.com

<<大棚花椰菜青花菜栽培答疑>>

图书基本信息

书名：<<大棚花椰菜青花菜栽培答疑>>

13位ISBN编号：9787533161033

10位ISBN编号：7533161033

出版时间：2012-9

出版时间：山东科学技术出版社

作者：李建永，周荣廷，王欣英 等 著

页数：158

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

《王乐义蔬菜栽培答疑丛书：大棚花椰菜青花菜栽培答疑》以深入浅出的形式介绍了各类常见蔬菜的栽培技术要点，还对蔬菜生长过程中常见的问题进行了疑难解答。
在编排方式上按照蔬菜种植操作顺序进行排列，便于农民朋友在具体实践中使用和查阅。
既包括蔬菜种植的常规技术，又包含介绍寿光菜农自创的实用技术，语言通俗易懂，内容简明扼要，确保广大农民看得懂、学得会、用得上。
相信《王乐义蔬菜栽培答疑丛书：大棚花椰菜青花菜栽培答疑》的出版会对全国各地的农民朋友发展蔬菜生产起到一定的指导、促进和借鉴作用。

第一图书网, tushu007.com

<<大棚花椰菜青花菜栽培答疑>>

书籍目录

1.花椰菜、青花菜的生育期有何特点？
2.花椰菜、青花菜生长对温度有什么要求？
3.花椰菜、青花菜生长对光照有什么要求？
4.花椰菜、青花菜生长对土壤水分和空气湿度有什么要求？
5.花椰菜、青花菜生长对气体条件有什么要求？
6.花椰菜、青花菜生长对土壤和营养条件有什么要求？
7.花椰菜、青花菜有哪些食用及药用价值？
8.生产上推广的花椰菜早熟品种有哪些？
9.生产上推广的花椰菜中熟品种有哪些？
10.生产上推广的花椰菜晚熟品种有哪些？
11.生产上推广的彩色花椰菜品种有哪些？
12.生产上推广的青花菜早熟品种有哪些？
13.生产上推广的青花菜中熟品种有哪些？
14.生产上推广的青花菜晚熟品种有哪些？
15.花椰菜栽培怎样进行品种选择？
16.花椰菜、青花菜的壮苗标准是什么？
17.育苗床土怎样配制、消毒和铺放？
18.怎样确定花椰菜、青花菜的播种量？
19.花椰菜、青花菜怎样浸种催芽和种子消毒？
20.花椰菜、青花菜怎样播种？
21.花椰菜、青花菜播种后至移植前怎样管理？
22.花椰菜、青花菜秧苗怎样移栽？
23.大棚冬春茬花椰菜、青花菜苗期怎样管理？
24.大棚早春茬花椰菜、青花菜苗期怎样管理？
25.大棚夏季花椰菜、青花菜反季节栽培苗期怎样管理？
26.保护地秋冬茬、秋茬花椰菜、青花菜苗期怎样管理？
27.保护地春茬花椰菜、青花菜苗期怎样管理？
28.花椰菜、青花菜大棚育苗怎样通风？
29.花椰菜如何做到巧育壮苗？
30.青花菜怎样做到巧育壮苗？
31.花椰菜育苗应注意什么问题？
32.花椰菜、青花菜工厂化育苗关键技术有哪些？
33.花椰菜、青花菜有哪些育苗方法？
34.花椰菜、青花菜的壮苗、徒长苗、老化苗有何区别？
35.花椰菜栽培过程中怎样进行施肥管理？
36.花椰菜、青花菜保护地栽培怎样进行根外追肥？
37.大棚越冬花椰菜如何进行肥水和温度管理？
38.花椰菜栽培怎么安排茬口？
39.花椰菜春季栽培中怎样做好定植管理？
40.青花菜春季栽培中怎样做好定植管理？
41.花椰菜越冬栽培中怎样进行定植后的管理？
42.青花菜定植后怎样进行田间管理？
43.花椰菜、青花菜塑料大棚早春茬栽培怎样管理？
……

章节摘录

1.花椰菜、青花菜的生育期有何特点？

花椰菜的生育周期包括发芽期、幼苗期、莲座期和花球形成期。

（1）发芽期：从播种到第1对真叶显露为发芽期。

此期发芽和生长适温为15～25°C，在春、夏、秋季一般需要7～10天。

发芽期主要依靠种子内自身贮藏的养分生长，所以饱满的种子和精细的苗床整地是出好苗的基本条件。

（2）幼苗期：从第1对真叶显露，到第1叶序5片叶展开为止。

幼苗期的生长适温为15～25°C。

此期的长短因幼苗的环境条件而异，在适温条件下需20～30天。

（3）莲座期：从第1叶序5片叶展开到莲座叶全部展开，并出现花球止为莲座期。

生长适温15～20°C，此期需20～80天。

莲座期是形成功能叶的主要时期，此期结束时中心叶片开始向内抱合。

（4）花球形成期：从花球开始出现到花球成熟为止。

一般需20～30天，生长的最适温度为14～18°C。

随后在适宜的条件下，花球松散，花薹和花枝伸长，花蕾膨大而开花结实，完成生殖生长阶段。

青花菜生育过程经历发芽期、幼苗期、莲座期、花球形成期，各时期的特点与花椰菜相似，但植株长势比花椰菜更强，茎叶更粗大，节间较长，短缩茎比花椰菜短而粗，植株比花椰菜更高大。

2.花椰菜、青花菜生长对温度有什么要求？

花椰菜性喜冷凉温和的气候条件，忌炎热，也不耐霜冻，对温度要求较严格。

气温过低时，不易形成花球；气温过高则促使花薹伸长，花球松散，很快丧失商品价值。

具体说来，营养生长适温为8～24°C，种子发芽适温为25 0C左右，花球形成适温为14～20°C。

气温低于8°C时花球生长缓慢。

遇0°C以下低温时，花球易遭受冻害。

气温高于24°C，花球膨大会受到抑制，花枝很快松散，花球品质差。

花椰菜的种子萌动后可以在较高温度条件下通过春化阶段，即在5～20°C温度范围内均可完成春化，其中10～17°C和幼苗较大时通过最快。

因此，花椰菜在反季节栽培条件下，也能结成花球。

……

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com