

<<常用中草药彩色图鉴>>

图书基本信息

书名：<<常用中草药彩色图鉴>>

13位ISBN编号：9787535758750

10位ISBN编号：7535758754

出版时间：2009-9

出版时间：湖南科学技术出版社

作者：刘塔斯 编

页数：287

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<常用中草药彩色图鉴>>

### 前言

我国中草药种类繁多，资源丰富。

一种中草药资源，当它作为一种植物存在时，它表现的是以枝、叶、花、果实的自然形态存在；当它作为药材应用时，它是天然的或经产地初加工的原料药；当以配方入药应用时，它是必须按照有关法规进行加工炮制后的饮片。

它的不同用途与形态带给我们不同的图像，使我们在识别与鉴别中草药时带来一定的困难。

为了保证中草药的稳定、安全与有效，准确识别与鉴别常用中草药的植物自然形态以及药材、饮片，我们组织长期从事中草药鉴别的有关专家，根据他们在植物资源调查以及科研工作中所积累的大量图片，编写了这本《常用中草药彩色图鉴》，以满足广大基层医疗单位、采集中草药人员以及中医药院校学生的需要。

本书收载了常用中草药125种，重点突出了常用同种中草药的原植物形态、药材、饮片的特征，并配有彩色图片，图文并茂，使读者能够快速、准确地识别与鉴别常用中草药。

现将本书的内容与特色介绍如下： 1.本书按中医的临床疗效将中草药分为17类。

精选了常用中草药125种。

记载内容包括别名、来源、产地、采收加工、原植物、性状特征、饮片特征、质量标志、化学成分、性味功能、用法用量、常用验方。

每味中草药均附有植物形态、药材形态、饮片形态3张图片。

2.常用验方主要是从古代和现代医药经典文献中挑选的经验方，具体应用时可随证加减，有毒药物及大剂量药方的应用应遵医嘱。

3.每味中草药彩色照片均经专家鉴定，精心挑选，以保照片的清晰度和科学性。

4.本书的参考文献主要以近版《中华人民共和国药典》一部与高等院校教材《中药鉴定学》等公开出版的权威著作或杂志文献为主，限于篇幅，未注明出处。

由于编者的水平有限，编写时间较为紧迫，不足或错漏之处在所难免。

敬希广大读者多提宝贵意见。

## <<常用中草药彩色图鉴>>

### 内容概要

本书收载了常用中草药125种，重点突出了常用同种中草药的原植物形态、药材、饮片的特征，并配有彩色图片，图文并茂，使读者能够快速、准确地识别与鉴别常用中草药。

为了保证中草药的稳定、安全与有效，准确识别与鉴别常用中草药的植物自然形态以及药材、饮片，编者们组织长期从事中草药鉴别的有关专家，根据他们在植物资源调查以及科研工作中所积累的大量图片，编写了这本《常用中草药彩色图鉴》，以满足广大基层医疗单位、采集中草药人员以及中医药院校学生的需要。

本书按中医的临床疗效将中草药分为17类。

精选了常用中草药125种。

记载内容包括别名、来源、产地、采收加工、原植物、性状特征、饮片特征、质量标志、化学成分、性味功能、用法用量、常用验方。

每味中草药均附有植物形态、药材形态、饮片形态3张图片。

<<常用中草药彩色图鉴>>

书籍目录

1 解表药白芷防风藁本荆芥麻黄生姜细辛紫苏叶薄荷柴胡葛根升麻木贼2 清热药天花粉知母栀子黄柏黄连黄芩龙胆苦参牡丹皮地黄玄参八角莲白花蛇舌草半边莲白头翁板蓝根绵马贯众秦皮射干土茯苓鱼腥草紫草重楼穿心莲山豆根3 泻下药大黄芦荟4 祛风湿药防己秦艽川乌威灵仙桑枝木瓜五加皮豨莶草麻口皮子药狗脊千斤拔5 芳香化湿药苍术广藿香厚朴佩兰6 利水渗湿药茯苓泽泻虎杖广金钱草金钱草7 温里药高良姜肉桂荜茇8 理气药化橘红木香乌药枳实9 消食药山楂10 驱虫药槟榔使君子11 活血化瘀药川芎姜黄延胡索郁金骨碎补丹参鸡血藤牛膝泽兰莪术毛冬青益母草12 止血药侧柏叶地榆白及三七仙鹤草茜草13 化痰止咳平喘药桔梗前胡天南星白附子浙贝母猪牙皂百部马兜铃枇杷叶矮地茶紫菀苦杏仁14 平肝熄火药天麻15 开窍药石菖蒲16 补虚药人参白术党参白芍甘草黄芪山药西洋参巴戟天杜仲续断淫羊藿当归何首乌百合黄精南沙参石斛玉竹绞股蓝天冬17 收涩药金樱子五倍子

<<常用中草药彩色图鉴>>

章节摘录

来源 芸香科 (Rutaceae) 植物黄檗 *Phellodendron amurense* Rupr. 除去栓皮的干燥树皮。

产地 主产于辽宁、吉林、河北等地。

采收加工 3~6月间采收。

选择生长10年以上的树，剥取一部分树皮，晒至半干，压平，刮净粗皮至显黄色，不可伤入内皮，刷净晒干，置干燥通风处，防霉变色。

原植物落叶乔木，树高10~25m。

树皮开裂，有加厚木栓层，内层鲜黄色。

单数羽状复叶，对生；小叶5~13片，矩圆状披针至矩圆状卵形，顶端渐尖，基部宽楔形或圆形，不对称，下表面仅中脉基部被长柔毛。

花单性，雌雄异株，排成顶生圆锥花序，花序轴密被短毛；萼片5；花瓣5~8。

浆果状核果球形，黑色。

花期5~6月，果期9-10月。

药材性状 药材呈板片状或浅槽状，长宽不一，厚2~4mm。

外表面黄绿色或淡棕黄色，较平坦，有不规则的纵裂纹，偶有灰白色的栓皮残留；残留的栓皮较厚，紧按有弹性，内表面黄色或黄棕色。

体轻，质较硬；断面鲜黄色或黄绿色，纤维性，有的呈裂片状分层，鲜黄色或黄绿色。

气微，味甚苦，嚼之有黏性。

饮片特征 饮片呈微卷曲的丝状，外表面黄绿色或淡棕黄色，较平坦，残留栓皮有弹性；内表面黄色或黄棕色。

体轻，质较硬，切面鲜黄色，呈纤维性。

气微，味苦，有黏性。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>