<<实用中草药彩色图集（第1册）>>

图书基本信息

书名：<<实用中草药彩色图集（第1册）>>

13位ISBN编号：9787535908926

10位ISBN编号：7535908926

出版时间：1997-8-1

出版时间：广东科技出版社

作者：罗献瑞

页数：474

字数：250000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<实用中草药彩色图集（第1册）>>

内容概要

本图集以实用为宗旨，故植物药、动物药和矿物药兼收并蓄，并取图文对照形式编排。

全书共收载中草药720余种，彩图730余幅，分三册出版。

第一册收录207种，以华南地区常用中药为主，其中相当部分为该地区习惯用药，故有一定的地区特色。

第二册收录230种，全为植物药，主要是我国南部、东部和中部疗效较确切的民间草药和部分中药，故该册对热心研究民间草药的人士特别有用。

第三册收录280种，其中动物药约80种，矿物药约40种，并于植物药中选收我国产名贵中药近20种及部分进中药材。

这些内容在通常所见普及性中草药书籍中尚不多见，故可补其不足。

<<实用中草药彩色图集(第1册)>>

书籍目录

一、全草类 广东刘寄奴 广东络石藤 广金钱草 广藿香 大头陈 大浮萍 山茨菇 小金牛草 石上藕 石韦 石斛 白花蛇舌草 灯心草 灵香草 鸡骨草 卷柏 青天葵 青蒿 苦地胆 金耳环 金黄泽 穿心莲 孩儿草 鬼羽箭 独脚金 广地丁 益母草 淡竹叶 淫羊藿 蒲公英 豨莶草 寮刁竹 薄荷二、根和根状茎类 广东升麻 广防己 三七 土白朮 大碎补 大蓟 山柰 山药 千斤拔 千年健 木黄连 木患根 附:木患子.....三、茎、枝和树皮类四、叶类五、花类六、果实、种子和孢子类七、树脂及其它类八、藻类和菌类中名索引拉丁名索引

<<实用中草药彩色图集(第1册)>>

章节摘录

苦地胆 别名 土公英。

来源 本品为菊科植物地胆头*Elephantopus scaber* Linn. 的干燥全草。

原植物 地胆头(图27)为具根状茎的多年生草本,高30~60厘米;茎粗壮,二歧分枝,密被白色紧贴硬毛。

叶大部分基生,近无柄,匙形或长圆状倒披针形,长5~18厘米,宽2~4厘米,顶端钝,基部渐狭,边缘具浅钝齿,两面被长硬毛;叶脉羽状,侧脉10对以上,离缘弯拱网结。

头状花序小,具4朵花,密集成顶生的复头状花序,基部围以3片卵形的叶状苞片}总苞片2层,长椭圆形,顶端渐狭成刺尖,被短糙毛;花秋冬开,淡紫色,同型,全为两性管状花,花冠长约8毫米,檐部扩大成漏斗状,上端5裂,常1片深裂;花药基部具钝耳;花柱枝丝状,顶端钻形。

瘦果纺锤形,具10纵棱,被短柔毛。

冠毛为5条硬刺毛,基部宽扁。

生于路旁、林缘或空旷草地上。

分布我国东南至西南部各省区。

全世界各热带地区均有。

采收加工 春、夏、秋季均可采收。

拔取全株,抖净泥沙,晒干。

药材性状 根状茎长仅1~2厘米,下端丛生多数黄色须根。

叶多为根生,近无柄,叶片纸质,皱缩,匙形或长圆状倒披针形,长通常8~12厘米或过之,灰绿色,疏被白色长硬毛,边缘具疏齿或近全缘。

花茎自叶丛中抽出,高出叶丛之上,直而硬,稍扁,长达25厘米,被硬毛,断面中空;茎生叶极少。

头状花序于花茎上顶生,花冠多脱落。

以叶多,色灰绿,无花者为佳。

性味和功用 苦、寒。

归肺、肝经。

清热解毒,利尿消肿。

用于感冒,鼻衄,黄疸,肠胃炎,咽喉炎,肾炎。

外用治湿疹,疔疮,蛇虫咬伤。

常用量10~15克。

附注 广东汕头和梅县等地所用的地苦胆为本种同属植物白花地胆头*E. tomentosus* Linn. 的全草。

后者茎多分枝,叶茎生,花白色与本种不同。

金耳环 来源 本品为马兜铃科植物金耳环*Asarum insigne* Diels的干燥全草。

原植物 金耳环(图28)为多年生草本;根状茎粗短,稍匍匐状,根密聚丛生,稍肉质,土黄色,直径2~3毫米,有浓烈的麻辣味。

叶膜质,长卵形或三角状卵形,长10~16厘米,宽6~11厘米,顶端渐尖,基部2深裂,后裂片耳形,外展,上面叶脉疏生短柔毛,透光可见小油点;叶柄长6~20厘米。

花早春开,单生于茎顶;花梗长2~9.5厘米,常稍弯;花被管钟形,长1.5~2.5厘米,中部以上扩大成一环突,然后缢缩;裂片3,阔卵形,平展,紫红色,基部有一半圆形垫状白色斑块;雄蕊12,花丝极短。

花药线形,伸出成锥尖或宽舌状;花柱6,顶端2裂。

蒴果长圆形,种子多颗。

; 生于海拔450~700米林下阴湿地,分布于广东中部以北、广西西北部和江西。

采收加工 春、夏季采挖全草,洗净,晒干。

药材性状 根状茎粗短,具节,根簇生于根状茎下端,细长,绳索状圆柱形,稍弯曲,长5~12厘米,灰色或土黄色。

<<实用中草药彩色图集(第1册)>>

质脆，易折断，断面白色，粉质。中央有一黄色小木心。

叶自根状茎节上长出，通常为2~4片；叶柄长8~20厘米，叶片灰绿色或棕绿色，常皱缩，展平后呈卵状三角形至卵形，膜质，长8~16厘米，宽6~10厘米，基部深2裂。

裂片叉开，稍尖或钝圆；两面无毛或叶脉上疏生短毛，对光透视，可见有许多小油点。

花单生，花梗长4~10厘米，花被阔钟形。管部向上扩大，至近喉部突然缢缩，裂片3瓣，扩展平伸。紫色，基部有一近圆形白色斑块。

气辛香，有辛辣味，嚼之强烈麻舌，久不消失。稍后有清凉感。

以根多而长、叶青绿、味辛辣强烈者为佳。

性味和功用 辛、微苦，温。

有小毒。

祛风散寒，解毒止痛。

用于跌打扭伤，毒蛇咬伤，龋齿痛，风寒型咳嗽，支气管炎。

外用治无名肿毒。

常用量2~5克。

附注 金耳环的主要特点是叶片有油点，根丛生，稍肉质，根和叶嚼之有强烈麻舌感。

花被裂片紫红色而基部有一白色大斑块，花梗长。

根据这些特点可以比较准确地判别金耳环的真伪。

小叶细辛A. ichangense C. Y. Cheng et C. S. Yang的根的外形、根和叶的辛辣味都和金耳环有些相似，是否能作金耳环入药，尚待研究。

金黄泽 别名 上树虾。

来源 本品为兰科植物聚石斛Dendrobium lindleyi Steud. (D. jenkinsii Auct. non Wall. ex Lindl.) 和密花石斛D. densiflorum Lindl. 的干燥假鳞茎。

原植物 1. 聚石斛(图29) 为多年生附生草本，茎聚生。有2~5节，膨大呈假鳞茎状，具4棱，长3~7厘米。

叶1枚顶生，椭圆形或长圆形，长2.5~9厘米，顶端微凹，基部具短柄。

夏季开花。

总状花序有2至多花生于近顶端的节上，花黄色；萼片3，中萼片卵状披针形。

长约1厘米。

萼囊近球形；花瓣椭圆形，比萼片宽，唇瓣近扁圆形，长1~2.3厘米，黄色中间橙红，顶端略凹，边缘具细缘毛，基部席卷，具爪，唇盘凹陷，被柔毛，合蕊柱极短。

果为蒴果。

附生于林中树干上或岩石上。

分布于广东、海南、广西、云南等省区。

亚洲热带地区亦有。

2. 密花石斛(图30) 为多年生附生草本；茎丛生，棒状或近圆柱状，长6~80厘米，中部粗达2厘米，基部收狭，干后常淡褐色。有4棱。

叶革质，3~4枚近顶生，长圆状披针形，长8~17厘米，宽2.5~6厘米，总状花序生茎的近顶部，具多花，下垂；总花梗基部被2~4枚鞘状苞片；花黄色，萼片3，长圆形，长约1.7厘米，萼囊近球形；花瓣近圆形，内凹，长约1.5厘米，边缘啮蚀状，具爪；唇瓣圆菱形，长1.7厘米，宽1.4厘米，具短爪，唇盘凹陷，上面被绒毛，边缘具流苏。

附生于密林中树上。

分布于海南岛、广西、云南南部和西藏东南部。

锡金、尼泊尔、印度等地亦有。

采收加工 全年可采，除去根、叶及毛衣，用沸水稍烫后，晒干或阴干。

药材性状 假鳞茎纺锤状，有3棱或4棱，长3~7厘米，径约1.5厘米。

表面金黄色，平滑，光亮，全体具3~4节，节处收缩。

质坚而体轻，纵向撕开，可见里面呈疏松海绵状，白色。

<<实用中草药彩色图集（第1册）>>

气微，味淡。

以个大、金黄色有光泽者为佳。

.....

<<实用中草药彩色图集（第1册）>>

媒体关注与评论

中医中药是中华民族优秀传统文化的重要组成部分。随着现代科学技术、特别是现代医药学的不断发展，人们日益认识到中医中药对人类健康的重要贡献。

中药是中医的物质基础，因此近年来在防治疾病中，中药的应用日趋广泛，对中药的研究也日趋深入。

正确识别中药材及其原植(动、矿)物是中药应用和研究的前提，也是中药材商品经营的基本知识。

为了方便中药从业人员、中药研究人员、各药科院校师生以及中药业余爱好者正确鉴别和使用中药，以促进我国传统医药学的发展，我们将历年在野外对照实物描绘的药用植(动、矿)物的彩图数百幅，辅之以文字说明，编写成《实用中草药彩色图集》一书，分册陆续出版。

我国地域广阔，中药生产和应用常有明显的地区特色。编绘者的工作单位在广东，所以书中以记载华南地区出产的中草药为主，而对其它地区的中草药则反映不够全面，这无疑是本书的一个不足之处，尚祈读者鉴谅。

编者学识有限，书中难免出现错漏和不妥之处，敬希读者指正。

编者 1991年8月于广州

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>