

<<肾病用药与配餐>>

图书基本信息

书名：<<肾病用药与配餐>>

13位ISBN编号：9787538438727

10位ISBN编号：7538438726

出版时间：2008-7

出版时间：吉林科学技术出版社

作者：刘平夫 主编

页数：203

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<肾病用药与配餐>>

内容概要

本书的第一部分为肾病的基本常识，简要介绍了什么是肾病，肾病是如何发生的，怎样及早发现肾病，肾病如何预防，药源性肾损害，尤其是中草药引起的肾损害的机制和预防等；第二部分是肾病的用药常识，从中我们可以了解合理的用药方案，药物的作用原理，如何选择针对性强的药物，需要了解的新药、进口药以及药物之间的配伍宜忌等；第三部分为肾病的常用药物，详细介绍了西药、中成药、中药单方、中药复方等；第四部分为常见肾病的推荐用药；第五部分为肾病患者的配餐常识，介绍了肾病患者的膳食指南，肾病病人的营养需求，如何制订合理配餐方案等；第六部分为肾病的合理配餐，介绍了肾病的常规配餐、特殊肾病的推荐配餐、肾病的食疗食谱。

本书不仅是肾病患者及其家人和现代家庭主妇的良师益友、家庭医生，也是基层医务工作者、保健人员和营养食疗爱好者的参考书，并适合各阶层人士阅读。

<<肾病用药与配餐>>

作者简介

刘平夫，1957年出生，医学博士，主任医师。

现任吉林省人民医院中医科主任。

长春中医药大学内科硕士生导师。

从事中医临床工作24年，在日本东北大学学习研究肾病多年，擅长以中西医结合方法治疗慢性肾功能衰竭及慢性肾炎血尿、蛋白尿，疗效显著，在肾病患者中享有较高的声

<<肾病用药与配餐>>

书籍目录

肾病治疗越早越好 什么是肾病 肾病是如何发生的 如何早发现肾病 得了肾病怎么办 肾病的危害 肾病可以预防吗肾病的用药常识 肾病患者须在专科医生指导下用药 制订合理的用药方案 肾病治疗药物的种类及作用原理 如何选择针对性强的肾病治疗药物 如何选择既经济又有效的肾病治疗药 需要了解的治疗肾病的新药、进口药 如何选择有免疫作用的制剂 如何选择治疗肾病的单方 如何选择治疗肾病的复方 治疗肾病西药联合应用的原则及配伍禁忌 治疗肾病中药的配伍禁忌 什么是马兜铃酸肾病 常见具有肾毒性的中药有哪些 肾病中西药的配伍禁忌 哪些肾病药影响患者食欲和营养状态 如何掌握肾病的用药时间和剂量 肾功能不全时如何调整抗生素 如何判定肾病的治疗效果 如何避免药物对肾脏的不良反应肾病的常用药物 抗菌药 利尿药 降压药 激素及免疫抑制剂 抗凝药 降糖药 降脂药 其他 中成药 中药单方 中药复方常见肾病的推荐用药 尿路感染用药 急性肾小球肾炎用药 慢性肾小球肾炎用药 肾结石用药 急性肾功能衰竭用药 慢性肾功能衰竭用药 肾病综合征用药继发性肾病及不同类型肾病的推荐用药 高血压的肾脏损害 糖尿病肾病 尿酸性肾病用药肾病的配餐常识 肾病患者的膳食指南 肾病患者的营养需求 如何制订肾病配餐方案 肾病患者的膳食如何进行合理烹调 如何计算配餐的营养素含量 有治疗肾病作用的食物 如何选择对肾病有提高免疫力作用的食物 如何进行各种食物搭配与互换 肾脏病人需忌口吗 不同肾病配餐各有其特殊性 如何配餐能减轻药物对肾脏的不良反应 肾病食物搭配忌用 食物与治疗肾病中药的配伍忌用肾病的合理配餐 肾病的常规配餐 春季配餐 夏季配餐 秋季配餐 冬季配餐 特殊肾病的推荐配餐 肾结石配餐 肾病综合征配餐 急性肾衰配餐 慢性肾衰配餐 肾病的食疗食谱 急慢性肾炎食疗食谱 肾性高血压食疗食谱 肾病综合征食疗食谱 水肿食疗食谱 血尿食疗食谱 肾性贫血食疗食谱 肾性蛋白尿食疗食谱 尿毒症食疗食谱

<<肾病用药与配餐>>

章节摘录

抗菌药 抗菌药依据它们的作用机制常用的有以下几大类：青霉素类 青霉素类为β-内酰胺类抗生素，属繁殖期杀菌剂，对敏感菌疗效可靠，不良反应少，价格低廉，可作为各种球菌、革兰阳性杆菌等感染的首选药物。

常用的主要有青霉素钠、青霉素V钾等。

青霉素钠【临床应用】主要用于溶血性链球菌等链球菌、革兰阳性杆菌引起的各种感染，如急性肾小球肾炎、慢性肾小球肾炎急性发作及肾功能不全合并上呼吸道感染等。

【用法用量】一般性感染可采用肌肉注射给药，每次40万～80万u，每日2次。

重症感染可静脉输注，每日500万～1000万U，分3～4次用药。

【不良反应】1．过敏反应：发生率占各种药物过敏反应中的首位，这是青霉素的一大缺点。

2．肾脏反应：长期大剂量应用青霉素G(2000万U日以上)，可引起急性肾功能损害，一般在用药8日后发生少尿、无尿、蛋白尿、血尿和血中尿素氮增高等症状。

【注意事项】可使乙酰水杨酸、氢氯噻嗪、利尿酸等半衰期明显延长，因此须适当减量。

青霉素V钾【临床应用】主要用于革兰阳性球菌引起的轻度感染，如肾病合并上呼吸道感染及妊娠期尿路感染等。

【用法用量】口服给药，每次0.5g，每日3～4次，饭前服用。

【不良反应】本品不良反应发生率低，主要不良反应为胃肠道烧灼感、恶心、呕吐及腹泻等，过敏反应少见。

但有过敏休克的病例报告。

<<肾病用药与配餐>>

后记

《用药配餐系列》自2006年1月出版后，一版再版，受到读者的厚爱。

作为这套书的责任编辑，我感到十分欣慰。

随着时间的流逝，药物和用药方案等也在发生着变化，为满足读者的需求，我们把书中内容重新做了调整，深入到前沿，与时代同行，将版本进行了修订，改为精华版，使之既严谨又轻松，更为适合读者的阅读口味。

《用药配餐系列》的12种图书针对12大疾病，冠心病、高血压、高脂血症、糖尿病、痛风、肾病、胃肠病、肝胆病、癌症、抑郁症、脑梗塞、哮喘病都是当今的常见病，与饮食、营养关系密切，或影响到饮食、营养。

这套系列书与以

<<肾病用药与配餐>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>