# <<好孕优生百科全书>>

#### 图书基本信息

书名: <<好孕优生百科全书>>

13位ISBN编号:9787542755537

10位ISBN编号:7542755536

出版时间:2013-1

出版时间:上海科学普及出版社

作者:岳然

页数:380

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

# <<好孕优生百科全书>>

#### 内容概要

《百科全书系列:好孕优生百科全书(权威版)》主要特点:1.全面——图书内容囊括了孕期生活、坐月子知识、产后恢复以及科学育儿的方方面面,有了这样一个"孕产育儿知识百科全书"帮手的协助,相信准妈妈和准爸爸可以更轻松、更安心地度过完美孕期,养育一个聪明健康的宝宝。2.权威——国家级著名孕产专家联合打造,真诚推荐。

涵盖最详细的孕前准备方案,最权威的孕期生活指导,最科学的先进育儿理念,最可行的实用育儿方法,由专家为您的孕产育儿全程保驾护航。

3.实用——既有理论内容,又有相关问题的解决方法,实用、亲切、贴心,是广大父母孕育宝宝的理想读物。

4.轻松——希望用最有趣的胎教方法、最贴心的孕期提示、最具操作性的育儿指导,陪您轻松快乐地 走过孕产育全程,培育一个更高智商、更高情商的宝宝。

## <<好孕优生百科全书>>

#### 书籍目录

PART 1怀孕的过程 精卵相遇 卵子的形成 排卵的发生 排卵信号 精子的形成 精子的竞争 精卵结合 生命的诞生 选取最佳的受孕时间 怀孕的概率 受精卵发育成胚泡 植入 双胎和多胎 父母的遗传 染色体和基因 宝宝的性别 身高遗传 容貌特征与遗传 怀孕的征兆 怀孕的早期征兆 确诊是否怀孕 预产期的推算 孕月及孕周 PART 2妊娠期身体变化 妊娠早期 第一孕月(1~4周) 怀孕第1周 怀孕第2周 怀孕第3周 怀孕第4周 第二孕月(5~8周) 怀孕第5周 怀孕第6周 怀孕第7周 怀孕第8周 第三孕月(9~12周) 怀孕第9周 怀孕第10周 怀孕第11周 怀孕第12周 妊娠中期 第四孕月(13~16周) 怀孕第13周 怀孕第14周 怀孕第15周 怀孕第16周 第五孕月(17~20周) 怀孕第17周 怀孕第18周 怀孕第19周 怀孕第20周 第六孕月(21~24周) 怀孕第21周 怀孕第22周 怀孕第23周 怀孕第24周 第七孕月(25~28周) 怀孕第25周 怀孕第26周 怀孕第27周 怀孕第28周 妊娠晚期 第八孕月(29~32周) 怀孕第29周 怀孕第30周 怀孕第31周 怀孕第32周 第九孕月(33~36周) 怀孕第33周 怀孕第34周 怀孕第35周 怀孕第36周 第十孕月(37~40周) 怀孕第37周 怀孕第38周 怀孕第39周 怀孕第40周 身体的变化 身体内部的变化 身体外形的变化 子宫环境的变化 妊娠期变化引起的不适 心悸及呼吸困难 ....... PART 3 妊娠期保健 PART 4 胎教有方 PART 5 妊娠期的健康饮食 PART 6 孕育之美 PART 7 妊娠期锻炼 PART 8 做一个合格的准爸爸 PART 9 分娩学习班 PART 10 分娩的过程 PART 11 产后保健与护理 PART 12 新生儿保健与护理

## <<好孕优生百科全书>>

#### 章节摘录

版权页: 插图: 受精卵移于子宫后开始发育,此时胎盘已酝酿并形成。

在胎盘组织的作用下,胚胎开始发育,无数绒毛的血管合起来形成三条大血管,其中一条为动脉、两条为静脉,三条血管通过脐带与胎儿相连。

一些深入子宫内膜组织间的绒毛,遇到小血管便产生蛋白溶化物质,使血管壁受到破坏,绒毛从母血中攫取营养物质,并把胚胎体内的废物排入母血。

这叫做母胎间的物质交换。

母胎之间的交换并不是畅通无阻的。

绒毛上皮虽然薄到只有百万分之一厘米厚,但它却在母胎之间形成了一道不易逾越的屏障,保卫着胎儿的安全。

这一屏障允许有利于胎儿的物质通过,抵制不利于胎儿的物质(当然这种抵制的能力也是有限的), 这样,母体内的营养物质和抗体,通过绒毛上皮进入胎体,使胎儿得以不断生长发育。

胚胎发育到12周,胎盘才真正形成。

胎盘功能最旺盛的时期是妊娠4~6个月时。

这段时期,胎盘帮助胎儿的消化、呼吸、循环、泌尿系统工作,并制造多种激素和酶来促进胎儿体内的生长活动。

约在第34周时,胎盘达到顶峰时期,以后便开始老化;之后2~3周,胎盘转运营养物质的效率降低,并开始纤维化,出现了凝血块和钙化斑——这是血管老化的征象;危险的是40周以后,胎盘便开始坏死,将不能为宝宝的生长发育提供充足的营养物质和氧气。

胎膜 在受精后的最初几周里,受精卵进行分裂分化,一部分形成胎儿的胚体部分,一部分则形成附属结构——胎膜,包括羊膜、卵黄囊、绒毛膜、尿囊、脐带。

胎膜对胚胎起保护和营养等作用。

胚胎发育至第3个月时,羊膜腔不断扩大;约第20周,羊膜与绒毛之间的胚外体腔消失;约第22周,随着胚胎的发育生长及羊膜腔的扩大,平滑绒毛膜与包蜕膜一起凸向子宫腔,并逐渐与壁蜕膜相融合,子宫腔由此消失。

此时,胚外体腔和子宫腔均消失,只有一个大的羊膜腔,使羊膜、平滑绒毛膜、包蜕膜、壁蜕膜都紧贴在一起,并与胎盘共同构成一个大囊,胎儿被包在囊内。

分娩时,这个大囊随胎儿一并娩出,临床上总称为衣胞。

脐带 第4周时,胚体在卷折形成圆柱形过程中,体蒂及其中的尿囊、尿囊血管和卵黄囊等随着包卷都挤到胚体腹侧,形成一个圆柱状结构,称为脐带。

脐血管的一端与胚胎的血管相连,另一端与胎盘绒毛内的血管相连。

## <<好孕优生百科全书>>

### 编辑推荐

《好孕优生百科全书(权威版)》既有理论内容,又有相关问题的解决方法,实用、亲切、贴心,是广大父母孕育宝宝的理想读物。

# <<好孕优生百科全书>>

### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com