第一图书网, tushu007.com

<<眼耳鼻喉科药物手册>>

图书基本信息

书名：<<眼耳鼻喉科药物手册>>

13位ISBN编号：9787542828514

10位ISBN编号：7542828517

出版时间：2002-06

出版时间：上海科技教育出版社

作者：陈念祖 编

页数：341

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

内容概要

目前，各种药物学参考书和药物手册版本较多，但专门针对眼耳鼻喉科医生临床实际需要的药物手册尚为少见，而作为一名专科医生，往往更需要了解一些专科用药及专科新药。
为此，将眼耳鼻喉科医院常用药物（包括中成药、医院制剂）的制剂规格、作用用途、用法用量及注意事项几个方面整理编写成册，供眼耳鼻喉科医生处方时参考。
《眼耳鼻喉科药物手册》基本上可以满足眼耳鼻喉科医生日常工作用药之需；也可供从事药剂和护理工作的人员及五官科病人查阅。

<<眼耳鼻喉科药物手册>>

书籍目录

上篇 眼耳鼻喉科常用西药第一章 眼科用药一、抗感染药金霉素红霉素磺胺醋酰氯霉素庆大霉素新霉素妥布霉素林可霉素(洁霉素)氧氟沙星(氟嗪酸、泰利必妥、信利妥)环丙沙星利福平(甲哌利福霉素)硼酸双氯芬酸－庆大霉素(复美新)那他霉素(纳他霉素、那特真)利巴韦林(三氮唑核苷、病毒唑)阿昔洛韦(无环鸟苷)二、激素类药氢化可的松甲泼尼龙(甲基强的松龙)泼尼松(强的松)地塞米松(氟美松)地塞米松－新霉素(复方地塞米松滴眼液)地塞米松－妥布霉素(典必殊)色甘酸钠－地塞米松(色地滴眼液)四环素可的松复方新霉素(帕利百)氟米龙泼尼松龙(强的松龙、氢化泼尼松)氟米龙－庆大霉素(易妥芬)三、抗青光眼药毛果芸香碱(匹鲁卡品)地匹福林(肾上腺素异戊酯、普鲁品)肾上腺素去氧肾上腺素(苯肾上腺素、新福林)噻吗洛尔(噻吗心安)左布诺洛尔(左旋丁萘酮心安、贝他根)卡替洛尔(美开朗)倍他洛尔(贝特舒)溴莫尼定(阿法根)拉坦前列素(适利达)乙酰唑胺(醋氮酰胺)醋甲唑胺(尼目克司)甘露醇甘油(丙三醇)四、散瞳药阿托品后马托品托吡卡胺(托品酰胺)复方托吡卡胺(美多丽)五、人工泪液甲基纤维素羧甲基纤维素钠(潇莱威)聚乙烯醇(利奎芬)泪然唯地息优乐沛六、抗过敏滴眼剂羟甲唑啉(欧斯啉)_左卡巴斯汀(立复汀)那素达吡嘧司特(研立双)色甘酸钠?_酮咯酸氨丁三醇(安贺拉)洛度沙胺(阿乐迈)七、其他氟比洛芬(氟联苯丙酸钠、欧可芬)硫酸锌依地酸二钠奥布卡因(倍诺喜)丁卡因(地卡因、潘托卡因)丙氧苯卡因(爱尔卡因)荧光素钠吡诺克辛(白内停)萘扑维(艾唯多)中新滴眼液(强力珍珠眼药水)普罗碘铵(安妥碘)卵磷脂络合碘(沃丽汀)羟苯磺酸钙(导升明)重组牛碱性成纤维细胞生长因子(贝复舒)环孢素(环孢霉素A、山地明、环孢菌素)卡巴胆碱(卡米可林)第二章 耳鼻喉科用药一、耳部用药过氧化氢(双氧水)红霉素林可霉素(洁霉素)氧氟沙星(氟嗪酸、泰利必妥)地塞米松－氯霉素酚甘油硼酸甘油硼酸醇麝香草酚水杨酸碳酸氢钠(苏打水)二、鼻部用药麻黄碱(麻黄素)呋喃西林－麻黄碱(呋麻)磺胺二甲嘧啶－麻黄碱苯海拉明－麻黄碱地塞米松－麻黄碱色甘酸钠－地塞米松酮替芬复方去氧肾上腺素(复方苯肾上腺素)左卡巴斯汀(立复汀)丙酸倍氯米松(伯克纳)……第三章 抗感染药第四章 维生素与矿物质药第五章 降血糖药第六章 解热镇痛药第七章 神经系统用药第八章 抗变态反应药第九章 镇痛药第十章 麻醉药及其辅助用药第十一章 心血管系统用药第十二章 呼吸系统用药第十三章 消化系统用药第十四章 泌尿系统用药第十五章 血液和造血系统有药第十六章 抗肿瘤药第十七章 调节水、电解质平衡药及肠内外营养剂第十八章 生物、生化及血液制品第十九章 眼耳鼻喉科常用中成药第二十章 卫鼻喉科用药第二十一章 肿瘤科用药第二十二章 内科用药下篇第二十三章 眼科觉疾病用药

章节摘录

【作用用途】 复美新为非甾体激素消炎镇痛药一双氯芬酸钠与氨基糖苷类抗生素一庆大霉素的复方制剂。
双氯芬酸钠：在眼部炎症反应和疼痛的发生上，前列腺素和白三烯起着重要作用，双氯芬酸钠可抑制环氧化酶，因而可抑制前列腺素的合成。
同时，也通过脂氧化酶的反应影响白三烯的生成。
庆大霉素：为一杀菌性氨基糖苷类抗生素，抗菌谱包括革兰阳性、阴性，需氧病原菌，如铜绿假单胞菌、葡萄球菌、流感杆菌和结膜炎杆菌、克雷伯菌属、肠杆菌、变形杆菌等，庆大霉素局部应用对引起眼前段感染的大多数细菌有良好的抑杀作用，其作用机制为抑制敏感细菌的蛋白质合成。
双氯芬酸钠和庆大霉素组成复方具有与单独应用庆大霉素相同的广谱抗革兰阳性和阴性病原菌的作用，双氯芬酸钠并不影响庆大霉素的抗菌效果。
动物研究表明，两者的联合组方不仅对结膜炎症，而且对化脓性角膜炎的完全愈合的作用均大于单独应用庆大霉素。
临床用于有细菌感染危险的眼前段炎症，如眼部手术后。
【用法用量】滴眼：每日4次，每次1滴，最长连续滴用一般不超过2周。

编辑推荐

《眼耳鼻喉科药物手册》是由上海科技教育出版社出版的。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com