

<<升级版>>

图书基本信息

书名：<<升级版>>

13位ISBN编号：9787543954212

10位ISBN编号：7543954214

出版时间：2012-8

出版时间：上海科学技术文献出版社

作者：管阳太 编

页数：176

字数：134000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<升级版>>

内容概要

《挂号费丛书：专家诊治癫痫（升级版）》10余万字，包括数百条目，或以问诊方式，一问一答，十分明确；或分章节段落，一事一叙一目了然。

作者简介

管阳太，男，现任第二军医大学附属长海医院神经科主任，神经精神病学教研室主任，主任医师，教授、博士生导师，上海科学院上海市脑血管病防治研究所所长，上海老龄科学研究中心中风防治研究所所长，上海市医学“领军人才”、“曙光学者”与“浦江人才”。兼任中华医学会神经病学分会委员，中国免疫学会神经免疫学分会委员，上海老年学会老年脑血管病防治专业委员会主任委员，上海市医学会神经内科专业委员会副主任委员，上海市中西医结合学会神经科专业委员会副主任委员，上海市中医药学会络病分会副主任委员，全军神经内科专业委员会常务委员，上海市神经科学学会理事，上海市医学会脑卒中分会委员等职。主要擅长脑血管病神经免疫性疾病、癫痫等疾病的诊断与治疗。主持与参加的科研项目，多次荣获全军上海市、第二军医大学科研成果嘉奖。发表了10余篇SCI医学论文，出版了《中风患者必读》等多部专著，并担任多种专业医学期刊的编委。

<<升级版>>

书籍目录

总序

患了癫痫主要有哪些症状

病人发生抽搐就是患了癫痫病吗

何谓癫痫

患了癫痫有哪些特征

中医学认为癫痫发作有哪些症状

癫痫发作时神志会丧失吗

癫痫发作与抽搐动作有关吗

何谓原发性癫痫

何谓继发性癫痫

癫痫疾病有哪些分类方法

什么是部分性发作

什么是单纯部分性发作

什么是复杂部分性发作

什么是自动症

什么是全面性发作

什么是失神发作

什么是失神持续状态

什么是大发作

什么是强直性发作

什么是阵挛性发作

什么是肌阵挛发作

什么是失张力发作

什么是癫痫综合征

什么是癫痫持续状态

什么是杰克森（Jackson）癫痫

什么是难治和耐药性癫痫

什么是月经性癫痫

什么是青少年肌阵挛癫痫

什么是原发性阅读性癫痫

什么是青少年原发性强直

什么是获得性癫痫失语

什么是儿童良性中央回癫痫

什么是婴儿重症肌阵挛性癫痫

什么是托德（Todd）瘫痪

什么是反射性癫痫

什么是额叶癫痫

什么是颞叶癫痫

什么是顶叶癫痫

什么是枕叶癫痫

什么是脑外伤癫痫

什么是老年癫痫

什么是韦斯特（West）综合征

什么是伦一格（Lennox-Gastaut）综合征

什么是头痛型癫痫

<<升级版>>

什么是腹型癫痫
什么是枕区放电的良性儿童癫痫
热性惊厥会发展为癫痫吗
儿童患癫痫有哪些特点
什么是痴笑性发作
什么是伴或不伴失神的眼肌阵挛性发作
什么是婴儿游走性部分性发作
什么是惊吓性癫痫
什么是家族性颞叶癫痫
什么是间脑癫痫
什么是晚发性癫痫
痫性发作和癔症发作有何区别
癫痫对儿童智能有哪些影响
患了癫痫需进行哪些项目诊断检查
癫痫病人应掌握哪些基础医学知识
医生对癫痫病人会进行哪些诊断治疗
经医生诊断治疗后病人应怎样进行康复
挂号费丛书·升级版总书目

章节摘录

版权页： 癫痫药物治疗是目前治疗癫痫最主要的治疗方法，服用抗癫痫药物时要注意服药剂量和服药时间。

平时用药，如果是一天3次，人们理解为早、中、晚3次跟着三餐走，但是这个时间对抗癫痫药来说是不科学的。

人们一般用餐时间在早上7时到下午6时之间，如果服用抗癫痫药物时间和用餐时间同步，那么药物主要在白天吸收，白天血液中的癫痫药物的浓度比较高，不良反应也随之增加；夜间由于长时间没有药物进入体内，导致血中的药物浓度过低，甚至不能达到抗癫痫的作用，从而影响药物的疗效。

更甚者有可能因药量低达不到控制发作的界限，以至于某些病人夜间经常癫痫发作。

应科学服用抗癫痫药物。

①维持癫痫药物浓度平均值为保证体内癫痫药物维持在有效浓度内，如果每日3次，正确服药时间间隔为8小时一次。

如果每日两次，每隔12小时服药一次。

②有肠胃疾病的病人服药前需加餐，某些抗癫痫药物的说明书会注明：餐前（或空腹）、餐后或餐时服用，这使病人产生一些误解。

其实，餐前指的是在餐前半小时至1小时，空腹指的是进餐2~4小时后即可。

注明餐后或餐时服用，多是因为此类药物对消化道有刺激性，食物可减轻这种不适；或是因为食物中的脂类物质有利于药物的吸收。

服用癫痫药物时，若服药时间与就餐时间间隔太久，可在服药前少量地吃些点心。

胃不好的病人可以先吃一点食物再吃药，以避免药物伤胃。

除了抗癫痫药，还有一些其他的药物，如抗生素、治疗震颤麻痹的药物等药理药性和抗癫痫药很相似，如果按照一日三餐的时间来服药，会影响药效。

癫痫病人对服药剂量、服药时间等都需要咨询主治医生，在医生的指导下用药，能够做到安全用药。何谓抗癫痫药物血浓度和稳态血浓度 癫痫病人服用抗癫痫药物期间，医生经常要化验血药浓度，并根据血药浓度调整剂量。

抗癫痫药物血药浓度是指在血浆中药物的含量，临床上真正起抗癫痫作用的是游离药物的血浓度。

稳态血浓度是指多次定时、定量、规律服药后药物的吸收量与排泄量接近相等时的血浓度。

药物达到稳态浓度的时间一般大约是该药的5个半衰期。

如在一定的时间内用药总量不变，改变服药次数一般不影响达到稳态的速度和浓度。

但减少服药次数会使该药浓度波动加大。

有效血浓度是指抗癫痫药物能完全或大部分控制癫痫发作，临床又没有中毒症状或没有不可耐受的不良反应的血药浓度，也就是达到治疗效果的稳态血药浓度范围。

临床医生根据这个浓度调整剂量，指导治疗。

<<升级版>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>