

<<常用中草药图谱及配方>>

图书基本信息

书名：<<常用中草药图谱及配方>>

13位ISBN编号：9787553200385

10位ISBN编号：7553200387

出版时间：2012-9

出版时间：贵州科技出版社

作者：杨卫平，夏同珩，李朝斗，等编

页数：321

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<常用中草药图谱及配方>>

内容概要

《黔版中草药彩色图谱系列：常用中草药图谱及配方（2）》编排顺序是：植物药按植物分科科名的汉语拼音字母顺序排列，对每一科中的种类，基本上按拉丁学名的字母顺序排列；动物药、矿物药则排列在植物药之后。

每个药按来源及药用部位（含拉丁名）、本草论述、形态特征（含生境及分布）、性味功效、常用配方（一般3~5首）、主要化学成分、现代研究等条目列项叙述；每个药配有1~2张具有鉴别特征的在生长实地拍摄的彩色照片。

《黔版中草药彩色图谱系列：常用中草药图谱及配方（2）》具有条理清晰、层次分明、内容新颖、文字简练、图文并茂、通俗易懂的特点。

可供执业医师、中医药专业医学生参考学习，也可供广大中医药爱好者使用。

<<常用中草药图谱及配方>>

书籍目录

杜仲 云芝(杂色云芝、瓦菌) 灵芝(木灵芝) 猪苓 茯苓 黄麻叶(苦麻叶) 番木瓜 广香藤(瓜馥木) 球果藤(土防己、毛青藤) 锡生藤(亚乎奴) 木防己 轮环藤(小青藤香、黑骨藤) 青藤 青藤香(大风藤、木防己) 北豆根(山豆根) 白药子(山乌龟) 地不容 千金藤 粪箕毒(粪箕笃) 防己(粉防己) 金果榄(地苦胆) 凤仙花 急性子 凤仙透骨草(透骨草) 水凤仙(华凤仙) 路南凤仙(亮光菜) 水金凤(水凤仙) 万年坝 黄金凤 野凤仙花 滇水金凤(昆明水金凤) 蕨(蕨菜) 凤尾草 蜈蚣蕨(蜈蚣草) 紫萍 浮萍(青萍) 乳香 橄榄 没药 珙桐(山白果) 谷精草 观音座莲(马蹄蕨) 广枝仁(光叶海桐) 山枝茶 海桐皮 旱金莲(金莲花、荷叶七) 苎草 芦竹(芦竹根) 青稞 燕麦(野燕麦) 苡仁(薏苡仁、薏仁米) 川谷(菩提子) 香茅 铁线草 稗 蟋蟀草(牛筋草、斗鸡草) 大麦 白茅根 淡竹叶(竹叶麦冬) 芭茅草(芭茅果) 谷芽(稻芽) 糯谷(糯米) 糯稻须根 稷(黍米) 狼尾草 芦苇(芦根、苇根、苇茎) 苦竹 黑竹(紫竹、紫竹根) 竹叶 金竹(竹衣) 慈竹 天竺黄 竹茹 竹沥 甘蔗 龙须草(硬质早熟禾) 皱叶狗尾草(马草) 狗尾草(毛毛草、洗草) 高粱 菅草(菅茅) 粟米(小米) 小麦 浮小麦 雀麦 麦芽 玉米须 箬竹(箬叶、粽粬叶) 刚竹 茭白(茭瓜) 三棱 海带 海金沙 红豆杉 紫杉 紫菜 马勃 石蝉草 豆瓣绿 山茹(爬岩香) 海风藤 毕茛(葶拔、葶茛) 胡椒 石南藤(岩胡椒、爬岩香) 黑芝麻(芝麻) 核桃 化香 枫杨(枫柳、麻柳) 羊奶奶(马鹊树) 蔓胡颓子(羊奶奶、牛奶子) 蔓胡颓子根(牛奶子根) 宜昌胡颓子(红鸡踢香) 盐孢藤(羊奶子) 胡颓子 胡颓子根 沙棘(沙枣) 盒子草(合子草) 冬瓜 冬瓜皮 冬瓜子(白瓜子) 土贝母 西瓜 西瓜皮(西瓜翠衣) 甜瓜蒂 甜瓜 黄瓜 南瓜 南瓜子 绞股蓝(七叶胆) 罗锅底(苦金盆、盘莲) 壶卢(瓢瓜、葫芦)

<<常用中草药图谱及配方>>

章节摘录

版权页：插图：云芝（杂色云芝、瓦菌）【来源及药用部位】多孔菌科真菌彩绒革盖菌*Coriolus versicolor* (L.ex Fr.) Quel的干燥子实体。

【本草论述】《本经》：“主胸中结，益心气，补中，增智慧，不忘。”

【形态特征】为腐生性真菌。

子实体半圆伞状，硬木质，深灰褐色，外缘有白色或浅褐色边。

菌盖长有短毛。

无柄，有环状棱纹和辐射状皱纹。

盖下色浅，有细密管状孔洞，内生孢子，管口面白色、淡黄色，管口每毫米有3~5个。

孢子圆柱形，无色，4.5~7mm×3~3.5mm。

云芝覆瓦状排列，相互连接，长1~10cm。

生于腐木上，也可栽培。

南方各省区有分布。

【性味功效】甘、淡，微寒。

健脾利湿，止咳平喘。

【常用配方】1.治乙型肝炎云芝15g，广金钱草30g，青刺尖20g，水煎服。

2.治慢性肝炎云芝，大乌泡根，三角风各30g，水煎服。

3.治白血病灵芝20g，油麻藤30g，血人参10g，水煎服。

4.治咳嗽云芝30g、岩豇豆30g水煎服。

【主要化学成分】云芝培养菌丝分离出糖蛋白。

【现代研究】药理研究显示有增强网状内皮细胞的吞噬作用，能提高免疫力。

现代临床用于治疗慢性乙型肝炎及流行性出血热等。

番木瓜【来源及药用部位】番木瓜科植物番木瓜*Cafica papaya* L.的果实。

【本草论述】《本草纲目》：“主心痛，煎汁洗风痹。”

【形态特征】软木质常绿小乔木，高2~8m。

茎一般不分枝，具粗大叶痕。

叶大，直径可达60cm，近圆形，掌状5~9深裂，裂片再为羽状分裂；叶柄中空。

花乳黄色，单性异株或为杂性，雄花序为下垂圆锥花序，雌花序及杂性花序为聚伞花序；雄花萼绿色，基部联合；花冠管细管状；雄蕊10，2轮着生于花冠上；雌蕊具短梗或近无梗，萼片绿色。

浆果矩圆形或近球形，熟时橙黄色，果肉厚。

种子多数，黑色。

花期全年。

生于村边、宅旁，有栽培。

分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南和贵州等地。

【性味功效】甘，平。

健胃消积，滋补催乳，祛风活血。

【常用配方】1.治关节痹痛番木瓜20g，水煎服。

2.治食积胃痛番木瓜、鸡屎藤各20g，青木香5g，水煎服。

3.治湿疹脚气番木瓜60g，土薏苡仁30g，炖猪蹄服用。

【主要化学成分】果实含番木瓜碱，木瓜蛋白酶，凝乳酶等；红色果实含番茄烃等。

【现代研究】药理研究显示有帮助蛋白质消化，抗生育，抗肿瘤，抗氧化，抗寄生虫和抗菌等作用。

现代临床用于治疗急性胃肠炎，消化不良，急性胃痛，湿疹，脚气病和过敏性皮炎等。

<<常用中草药图谱及配方>>

编辑推荐

《常用中草药图谱及配方2》具有条理清晰、层次分明、内容新颖、文字简练、图文并茂、通俗易懂的特点。

可供执业医师、中医药专业医学生参考学习，也可供广大中医药爱好者使用。

<<常用中草药图谱及配方>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>